

中神種苗店 2026年 秋播き野菜カタログ

ナカガミのタネ



No.98



株数 (10a) 5,000 ~ 6,800 株

は種量 (10a) 20ml × 2 ~ 3 袋 コート 1 ~ 2 缶

風みやこ (YR547)


コート 5000 粒

砂土質 粘土質

1 月 ~ 2 月どり

品種特徴

- 8月3日~8月15日播き、12月下旬~2月収穫。
- 定植後100日位で収穫可能な中晩性品種。
- 球形は甲高扁円球で、在圃性に優れる。
- 樹勢は中位で、球の締まりがよく重量が出るので加工業務用にも適する。
- 葉肉は厚く、厳寒期の耐寒性に優れ、球表面の霜痛みに強い。



NEW

みぞれ雪 (YKK001)


コート 5000 粒

砂土質 粘土質

1 月 ~ 3 月上旬どり

品種特徴

- 耐霜性・低温肥大性に優れる中生品種。
- 耐寒性・低温伸張性に優れるため厳寒期の栽培に向く。
- 裂球しにくく在圃性に優れるため収穫期の調整がしやすい。



NEW

かぜ姫 (YKK881)


コート 5000 粒

砂土質 粘土質

2 月 ~ 3 月どり

品種特徴

- 低温肥大性・結球性に優れる中晩性品種
- 揃いが良いので、一斉収穫にも向く。
- 脇芽の発生がすくないため、3月末収穫も可能。



NEW

藍天

コート 5000 粒

生種 2000 粒

砂土質 粘土質



10 月どり

品種特徴

- 7月10日~7月20日播き、10月収穫。
- 石灰欠乏症など生理障害に強く、高温期でも栽培しやすい。
- イオウ病抵抗性、黒腐病耐病性があり、高温条件下でも腐りや裂球が遅い。
- 暑さに強く、球揃いが良いので一斉収穫に適する。

YR しぶき

コート 5000 粒

生種 20ml

砂土質 粘土質



10 月 ~ 11 月どり

品種特徴

- 7月20日~8月5日播き、10月~11月収穫。
- イオウ病抵抗性で黒腐病にも強く栽培が容易。
- 熟期は定植後70日前後で、1.5kg程度になる。高温肥大性にも優れ、甲高扁円球で良く締り、生産性の安定した豊産種。
- 葉質は歯切れ良く、食味は良好。

早生光

コート 5000 粒

生種 2000 粒

粘土質



11 月 ~ 12 月どり

品種特徴

- 7月20日~8月5日播き、11月~12月収穫。
- 球形は扁平形で、球色が濃く球内色が淡黄色となる。
- 外葉は半立性で、草勢がやや旺盛で栽培が容易である。
- イオウ病抵抗性で、黒腐病に耐病性がある。

YR なごみ

コート 5000 粒

生種 2000 粒

砂土質 粘土質



好評

10 月下旬 ~ 11 月どり

品種特徴

- 7月20日~8月5日播き、10月下旬~11月収穫の早生寒玉品種。
- 色は濃緑色で、球形は扁円形で安定する。
- 耐暑性に優れ、草勢も旺盛で安定した栽培性を持っている。
- 倒伏が極めて少なく一斉収穫に向く。
- 球伸び・球揃い・重量のりが良く、在圃性に優れる。



かぐや

コート 5000 粒 生種 2000 粒 粘土質



■ 11 月どり

- 品種特徴**
- 7月20日～8月3日播き、11月収穫。
 - 暑さに強く、生理障害の発生が少ない。
 - 株がコンパクトで、球揃いが抜群。
 - 株腐病の防除を徹底する。
 - 湿度の高い圃場や、結球期の雨が多い年は注意する。

ナカガミのタネ YR しわす

コート 5000 粒 生種 2000 粒 粘土質



■ 11 月～ 12 月どり

- 品種特徴**
- 7月25日～8月10日播き、11月～12月収穫。
 - 球揃いの良い年内どり品種。イオウ病抵抗性で、高品質多収量種。
 - 球は 1.5kg 程度、球色は濃緑色で、球肥大や球揃いが良く、秀品率が高い。

ナカガミのタネ YR888

コート 5000 粒 生種 2000 粒 粘土質



■ 11 月中旬～ 12 月上旬どり

- 品種特徴**
- 7月20日～8月5日播き、11月下旬～12月収穫。
 - 色は濃緑色で、定植後80日で収穫できる。
 - 球の尖りや角張が無く、作型・気候による球形の乱れが少ない。
 - 球締り・球揃い・重量のりが極めて良く加工出荷にも向く。

ナカガミのタネ YR886

コート 5000 粒 生種 2000 粒 粘土質



■ 11 月下旬～ 12 月どり

- 品種特徴**
- 7月25日～8月10日播き、11月下旬～12月収穫。
 - 収穫期は定植後75日前後。
 - 球が締まりながら肥大し、重量のりが良い。
 - 球形は高円球で箱詰め作業が容易。

ナカガミのタネ YR つむぎ (NK-970)

コート 5000 粒 粘土質



■ 12 月中旬～ 1 月どり

- 品種特徴**
- 8月3日～8月10日播き、12月中旬～1月中旬収穫。
 - 球色は鮮やかな濃緑色扁円球となる。
 - 低温伸張性と耐寒性に優れる。
 - 厳寒期に肥料切れするとアントシアンが発生するので注意する。

かぜ 風あすか (YR545)

コート 5000 粒 砂土質 粘土質



■ 12 月上旬～ 2 月中旬どり

- 品種特徴**
- 8月1日～8月10日播き、12月上旬～2月中旬収穫。
 - 球色は鮮やかな甲高扁円球で、在圃性に優れる。
 - 球の肥大性に優れるため、業務用加工にも適する。
 - 葉肉が厚いので耐寒性に優れ、霜傷みにも強い。

ナカガミのタネ YR そうてん (NK-969)

コート 5000 粒 粘土質



■ 12 月下旬～ 1 月どり

- 品種特徴**
- 8月3日～8月10日播き、12月下旬～1月収穫。
 - 樹勢は比較的強く、濃緑色の扁円球となる。
 - 低温伸張性があり、在圃性にも優れる。
 - 厳寒期にはアントシアンが強く入ることがあるため肥料切れに注意する。

とうらん 冬藍

コート 5000 粒 生種 2000 粒 粘土質



■ 12 月～ 1 月どり

- 品種特徴**
- 8月5日～10日播き、12月～1月収穫。
 - ゴマ症などの生理障害に強く、球内部のアントシアンも発生しにくいため、低温期に栽培しやすい。
 - イオウ病抵抗性、黒腐病耐病性を持つ。
 - 歩留まり良く、加工・業務用に最適。





えんらく

円楽

コート 5000 粒

生種 2500 粒

粘土質



■ 12 月～ 1 月どり

品種特徴

- 8 月 5 日～ 8 月 10 日播き、12 月～ 1 月収穫。
- 耐寒性があり、12 月以降の収穫でも葉の傷みが少ない。
- 球の形状は扁円球で安定している。
- 草姿はやや開張性で、草勢は中程度。
- 球締りが良く、重量感がある。
- 在圃性があり、生食から加工まで幅広く使える。

ふゆ

冬きらり

コート 5000 粒

生種 2500 粒

砂土質

粘土質



■ 12 月中旬～ 2 月上旬どり

品種特徴

- 8 月上旬～ 8 月中旬播き、12 月中旬～ 2 月上旬収穫。
- 球は光沢のある濃緑色で、やや扁平になる。
- 肥大性に優れ、締まりとかがよく重量のりがよい。
- 大玉になり重量がのるので、加工業務用にも向く。

ナカガミのタネ

ふゆ

YR 冬なぎ (NK-168)

コート 5000 粒

砂土質

粘土質



■ 1 月上旬～ 2 月どり

品種特徴

- 8 月 3 日～ 8 月 15 日播き、1 月中旬～ 2 月収穫。
- 樹勢が強く、形状は甲高扁円球となる。
- 球肥大性に優れ、重量のりもよいため、加工業務用に向く。
- 球色は鮮やかな緑色で球揃いが良い。

ふゆ

冬武将

コート 5000 粒

生種 2500 粒

砂土質

粘土質



■ 1 月～ 3 月どり

品種特徴

- 8 月上旬～ 8 月中旬播き、1 月～ 3 月収穫。
- 生育は旺盛で重量のりがよいので加工業務にも向く。
- 低温でも生育は進み、葉が厚いので厳寒期でも痛みが少ない。
- 萎黄病に抵抗性で黒腐病にも強い。

とうこん

冬魂

コート 5000 粒

生種 2500 粒

砂土質

粘土質



■ 12 月～ 1 月どり

品種特徴

- 8 月上旬～ 8 月中旬播き、12 月～ 2 月上旬収穫。
- 生育は旺盛で、肥大性と在圃性に優れるので加工業務用にも向く。
- 耐寒性に優れ、低温期でも肥大性がある。

ナカガミのタネ

YR かなな

コート 5000 粒

生種 2000 粒

粘土質



■ 12 月～ 2 月中旬どり

品種特徴

- 8 月 5 日～ 8 月 18 日播き、12 月中旬～ 2 月収穫。
- 球形は平円球で、球色は濃緑色。
- 裂球が遅いため、収穫期間の幅が広い。
- 葉肉が厚いため傷みやアントシアンの発生が少ない。

ふゆぎんが

冬銀河

コート 5000 粒

生種 2500 粒

砂土質

粘土質



■ 1 月～ 2 月どり

品種特徴

- 8 月上旬～ 8 月下旬播き、1 月～ 2 月収穫。
- 草勢は強く、草姿立性で球揃いが良い。
- 肥大性がよく、収穫作業性が優れるため、加工業務に向く。
- 球はやや扁平で色が良く、軸部は細く切りやすい。

ナカガミのタネ

冬こづち

コート 5000 粒

生種 2000 粒

粘土質



■ 1 月上旬～ 2 月どり

品種特徴

- 8 月 3 日～ 10 日播き、1 月上旬～ 2 月収穫。
- 球形は扁円球で揃いが良く、鮮やかな緑色の締った球が収穫できる。
- ゴマ症になりにくく、肥沃地に向く。
- 在圃性が良く、収穫期間の幅が広い。
- L 玉～ 3 L 玉中心で重みもしっかりのる。





ナカガミのタネ YR むつき

コート 5000 粒

砂土質 粘土質



■ 1 月～ 2 月どり

品種特徴

- 8月13日～8月25日播き、1月～2月収穫。
- 低温肥大性、在圃性に優れる。
- 球色は濃緑色で、尻腐病に強い。
- 霜害によりアントシアンが発生するので、肥料切れしないように注意する。

そらと

コート 5000 粒

生種 2000 粒

砂土質 粘土質



■ 1 月下旬～ 3 月どり

品種特徴

- 8月10日～20日播き、1月下旬～3月収穫。
- 多肥栽培でもゴマ症の発生が少ない。
- 形状は甲高豊円球で形状安定に優れ、球色は濃緑でアントシアンの発生が少ない。
- イオウ病に抵抗性を持つ。

ナカガミのタネ YR あにき

コート 5000 粒

砂土質 粘土質



■ 1 月中旬～ 3 月どり

品種特徴

- 8月10日～8月25日播き、1月中旬～3月収穫。
- 球色は鮮やかな濃緑色の甲高扁円球となる。
- 形状が甲高扁円球で安定しているため、箱詰め作業がしやすい。
- 樹勢は中程度で、重量のりもよいため、加工業務用にも向く。
- 厳寒期に肥料切れするとアントシアンが発生するので注意する。

ゆき かせ 雪風

コート 5000 粒

生種 3000 粒

砂土質 粘土質



■ 1 月中旬～ 2 月どり

品種特徴

- 8月10日～8月25日播き、1月～2月収穫。
- 球形は扁円球で、球色は濃緑色。
- 外葉はコンパクトで、根張りが良く、肥大性がある。
- 外葉は小さい品種なので、肥料が多いと結球が悪くなるので、追肥でコントロールする。

栽培ポイント

ナカガミのタネ YR たかみね

コート 5000 粒

生種 2000 粒

砂土質 粘土質



好評

■ 2 月～ 3 月どり

品種特徴

- 8月10日～25日播き、2月～3月収穫。
- 球の形状はやや扁円球で晩抽性、低温肥大性に優れる。
- 球は濃緑色で、球伸び良く、在圃性が良く、収穫期間の幅が長い。
- イオウ病抵抗性で黒腐病にも強い。

ふ ゆ 冬のぼり

コート 5000 粒

生種 2500 粒

砂土質 粘土質



■ 3 月～ 4 月どり

品種特徴

- 8月20日～25日播き、3月～4月収穫。
- 明るい青緑色の腰高扁円球で締りが良く、重量感のある寒玉となる。
- イオウ病抵抗性を持ち黒腐病にも強い。
- 遅播きには注意する。

ナカガミのタネ えんよう

コート 5000 粒

砂土質 粘土質



■ 3 月～ 4 月どり

品種特徴

- 8月10日～8月25日播き、3月～4月収穫。
- 球色は光沢のある濃緑色で肉質が厚い。
- 球肥大性に優れ、球締まりもよく、在圃性に優れる。
- 球形は甲高扁円球で、球色は鮮緑色。

せ い り ゅ う 青龍 345

コート 5000 粒

生種 2000 粒

砂土質 粘土質



■ 3 月～ 4 月どり

品種特徴

- 8月20日～25日播き、3月～4月収穫。
- 葉は濃緑の甲高扁円球で、芯の伸びは遅い。
- 根張りは中位で、低温肥大性に優れる。
- イオウ病抵抗性を持ち、葉肉は厚く、厳寒期の耐寒性に優れ腐敗にも強い。



りゅうけい
龍溪

PVP

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質



■ 2月～4月どり

- 品種特徴**
- 8月10日～8月23日播き、2月～4月収穫。
 - 濃緑色の甲高扁円球で、芯は細く歩留まりが良い。
 - 樹勢は中位で、低温結球性に優れる。
 - 葉肉は厚く、退色が遅いので冷蔵性がある。

- 栽培要点**
- 定植遅れは軟結球を招きやすいため、定植は9月23日までに行う。

ナカガミのタネ
りくよう

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質



■ 3月～4月どり

- 品種特徴**
- 8月17日～8月25日播き、3月～4月収穫。
 - 球色は濃緑色で、低温貯蔵時の退色が少ない。
 - 耐寒性が強いので越冬中に傷みにくく、また湿害にも強いので栽培管理がしやすい。
 - 結球は充実型で、球揃い・重量のりが良く加工出荷にも向く。
 - 裂球は遅く、在圃性に極めて優れる晩抽性品種。

ふゆ
冬はるか

コート 5000 粒 生種 2500 粒 砂土質 粘土質



■ 3月～4月どり

- 品種特徴**
- 8月15日～8月25日播き、3月～4月収穫。
 - 形状は甲高で球揃いが良い。
 - 耐寒性に優れ、厳寒期でも外葉の傷みや、アントシアンが発生が少ない。
 - 軸が細いため切りやすく、わき芽の発生も少ないため、収穫作業性に優れる。
 - 重量のりがよいため、加工用にも向く。

ばんちゅう
晩抽かんだ

コート 5000 粒 砂土質 粘土質



■ 3月～4月どり

- 品種特徴**
- 8月20日～9月5日播きで、3月～4月収穫に適した晩抽性の品種。
 - 草姿は立性で樹勢が強く、甲高扁円球の大玉となる。
 - 球締りも良く、球肥大性にも優れるため重量のりが良い。
 - 従来の晩抽性品種よりもさらに晩抽性に優れる。
 - 強草勢の為、肥沃地では施肥を抑える。

～根こぶ病耐病性品種～

すいりよく
翠緑

根こぶ病
耐病性品種

コート 5000 粒 生種 20ml 砂土質 粘土質



■ 12月～1月上旬どり

- 品種特徴**
- 8月5日～8月15日播き、12月～1月上旬収穫。
 - イオウ病に抵抗性で、根こぶ病耐病性をもつ。
 - 湿害に強く、水田の後作でも安定した収穫が期待できる。
 - 裂球が遅く、在圃性に優れる。

YCRふゆいろ

根こぶ病
耐病性品種

コート 5000 粒 生種 2500 粒 砂土質 粘土質



品種登録出願番号「第34174号」

■ 12月上旬～1月中旬どり

- 品種特徴**
- 8月1日～8月13日播き、12月上旬～1月中旬収穫。
 - 球形は扁円球で、球伸びに優れる。
 - アントシアンの発生も少なく、裂球が遅いため収穫幅がある。
 - こぶができて小さなこぶに抑えるため、根こぶ病汚染圃場でも安定して収穫できる。

ナカガミのタネ **CTみかさ**

根こぶ病
耐病性品種

コート 5000 粒 生種 2500 粒 砂土質 粘土質



■ 12月下旬～1月どり

- 品種特徴**
- 8月5日～8月13日播き、12月下旬～1月収穫。
 - イオウ病抵抗性で、根こぶ病耐病性を持つ。
 - アントシアンの発生が少なく、裂球が遅く在圃性があるため、1月収穫も可能。
 - 草勢が旺盛で、作りやすい。

YCRきよまさ

根こぶ病
耐病性品種

コート 5000 粒 生種 2500 粒 砂土質 粘土質



■ 1月～2月どり

- 品種特徴**
- 8月1日～8月15日播き、1月～2月収穫。
 - 定植後約100日で収穫となる中晩生種で、球色は緑色、形状は甲高扁円となる。
 - 樹勢が強く、重量がしっかりとる。
 - 晩生で耐寒性に優れ、年明け収穫に向く。定植が遅れると球の締まりが悪くなるので、適期に定植する。





ナカガミのタネ YR ハニーキャベツ

コート 5000 粒 生種 2000 粒 粘土質



■ 12月～1月どり

- 品種特徴**
- 糖度が高く、甘みの強い美味しいキャベツ。
 - 球色は光沢のある鮮緑色で、形状は甲高円球。
 - シャキシャキとした食感で生食向き。

- 栽培ポイント**
- 寒さにあたると糖度が上がるので、早まきは避ける。
 - 在圃性はあまりないので適期収穫する。

ナカガミのタネ YR 耐寒ハニー

コート 5000 粒 粘土質



■ 1月～2月どり

- 品種特徴**
- 8月15日～20日播き、1月～2月収穫。
 - 食味はサクサク感があり、糖度は10度前後になる。
 - 厳冬期でも球の傷みや内部の異変が発生しにくい。

- 栽培ポイント**
- 生育が旺盛のため、追肥主体の管理をする。
 - べと病、黒腐病には比較的強いが、適宜予防散布を行う。

ナカガミのタネ ロードライト

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質



■ 11月～3月どり

- 品種特徴**
- 7月20日～8月15日播き、11月～3月収穫。
 - 球色は濃赤紫で鮮やかな発色。
 - 草勢は比較的強く、耐暑性に優れる。
 - 裂球は遅く、在圃性があるので計画出荷できる。

- 栽培ポイント**
- 元肥主体で施肥を行い、外葉を伸ばしておき、追肥により中後半も肥切れしないようにする。

レッドブライト

コート 5000 粒 生種 2000 粒 粘土質



■ 11月～3月どり

- 品種特徴**
- 7月中旬～8月中旬播き、11月～3月収穫。
 - 球色は濃紫色で内部まで発色よい。
 - 正円球で球重1.3kg程度。

- 栽培ポイント**
- 球張りは大人しいので、密植では生育不良となり、小玉になるので適切な株間とする。
 - 生育初期から黒腐病の予防をする。


ナカガミのタネ NH-015

コート 5000 粒 砂土質 粘土質

■ 1月～2月どり

- 品種特徴**
- 8月1日～8月20日播き、1月～2月収穫。
 - 樹勢は比較的強く、形状は甲高扁円球となる。
 - 球肥大性に優れ、重量のりがよい。
 - 球色は鮮やかな緑色で球揃いが良い。

- 栽培ポイント**
- 初期生育が悪いと株張りが悪くなるので、定植後の活着をスムーズに行う。
 - 黒腐病には比較的強いが発病しないわけではないので、定期的に薬散防除を行う。



予告


ナカガミのタネ NH-2300

コート 5000 粒 砂土質

■ 2月下旬～3月どり

- 品種特徴**
- 8月18～9月5日播き、3月収穫。
 - 草姿は立性で、球形は甲高扁円～甲高球となる。
 - 晩抽性と在圃性のいずれにも優れる。
 - 樹勢が強いため、慣行品種で成育の悪い圃場での栽培に適する。

- 栽培ポイント**
- 強草勢の為、施肥を抑え生育を見ながら追肥で管理する。
 - 作型的に菌核病が発生するので定期的に薬散防除を行う。



予告




はな 花かぐら

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質

■ 11 月中旬～ 1 月どり

- 品種特徴**
- 7 月下旬～ 8 月 10 日播き、11 月中旬～ 1 月収穫。
 - 栽培初期から生育旺盛で、樹勢が強い。
 - 球形は甲高扁円球となり、裂球が遅く在圃性に優れる。

- 栽培ポイント**
- 低温結球性が弱いので、8 月 10 日までの播種とし、植え遅れに注意する。




ふくしゅん ナカガミのタネ ゴールド福春

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質

■ 11 月中旬～ 12 月下旬どり

- 品種特徴**
- 8 月上旬～ 15 日播き、11 月中旬～ 12 月下旬収穫。
 - 球の肥大性に優れ、割れにくい良質のサワーキャベツ。
 - 生育旺盛で、在圃性に優れる。
 - 低温結球性が弱いので 8 月 15 日播きまでとする。




ふくしゅん ナカガミのタネ YR 福春

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質

■ 12 月上旬～ 2 月中旬どり

- 品種特徴**
- 8 月中旬～ 下旬播き、12 月上旬～ 2 月中旬収穫。
 - イオウ病抵抗性で黒腐病にも強く、耐寒性もあり作りやすい。
 - 葉色は鮮緑色でアントシアンの発生も少ない。
 - 厳寒期でも肥料切れをさせなければ、鮮緑の良い球が収穫できる。




はるなぎエース

コート 5000 粒 生種 20ml 砂土質 粘土質

■ 12 月～ 2 月上旬どり

- 品種特徴**
- 8 月中旬播き、12 月～ 2 月上旬収穫。
 - イオウ病抵抗性で、黒腐病にも強い。
 - 耐寒性が強く、厳寒期の球の腐敗が少ない。
 - 甲高扁円球で、芯が細い。
 - 葉質は柔らかく、食味が良い。




みさき ナカガミのタネ YR はな岬

コート 5000 粒 生種 2000 粒 粘土質

■ 12 月上旬～ 2 月どり

- 品種特徴**
- 8 月上旬～ 8 月下旬播き、12 月上旬～ 2 月下旬収穫。
 - 従来の春系に比べて在圃性がある。
 - 球色は照りのある淡い緑色。
- 栽培ポイント**
- 中後期に肥料切れや極度の乾燥にあたると玉伸びが悪くなる他、アントシアンの発生しやすくなるので注意。




好評

けいしゅん ナカガミのタネ YR 京春

コート 5000 粒 砂土質 粘土質

■ 1 月上旬～ 2 月下旬どり

- 品種特徴**
- 8 月 10 日～ 8 月 23 日播き、1 月上旬～ 2 月下旬収穫。
 - 球色は濃緑色で、厳寒期での傷みやアントシアンの発生が少ない。
 - 生育旺盛で、在圃性に優れる。
- 栽培ポイント**
- 晩抽性はないので極端な遅播きや、収穫遅れに注意する。



好評




まいぞめ

コート 5000 粒 生種 3000 粒 砂土質 粘土質

■ 12月中旬～2月どり

品種特徴

- 8月上旬～下旬播き、12月中旬～2月収穫。
- イオウ病Aタイプ抵抗性で、尖り玉になりにくく、箱詰め作業が容易。
- 春系品種の中では比較的茎が硬くなりにくく、収穫作業が容易。
- 3月どりの晩抽性は持っていないので、収穫遅れに注意する。



ナカガミのタネ さきがけ

コート 5000 粒 生種 2000 粒 粘土質


■ 1月～2月どり

品種特徴

- イオウ病抵抗性で、耐寒性が強く、厳寒期でもアントシアンの発生が少ない。
- 外葉は立性で株張りは中位で球の揃いが良い。

栽培ポイント

- 8月20日以降に播種する。それ以前の早播きは裂球の原因になるので注意する。
- 乾燥によるカルシウム欠乏に注意する。水もちの良い圃場に作付けする。




はるみさき 春岬

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質

■ 2月～3月上旬どり

品種特徴

- 8月20日～9月5日播き、2月～3月上旬収穫。
- 湿害に対して強く、土質も選ばず馬力がある。
- 盆前などの早播きは避け、8月20日以降の播種がおすすめ。
- 球揃いが良いので、収量性が高い。



ナカガミのタネ YR 太陽

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質

■ 1月中旬～3月中旬どり

品種特徴

- 8月中旬～9月上旬播き、1月中旬～3月中旬収穫。
- 生育は旺盛で外葉は多い。
- 球の形状はやや扁平球。球色はきれいな鮮緑色で、アントシアンの発生は少ない。
- 裂球は遅く、晩抽性があるため在圃性に優れる。




ナカガミのタネ YR はるみち

コート 5000 粒 砂土質 粘土質

■ 1月下旬～3月上旬どり

品種特徴

- 8月15日～9月3日播き、1月下旬～3月上旬収穫。
- 球形は扁平球で、低温肥大性に優れる。
- イオウ病抵抗性で、黒腐病にも強い。
- 草勢は旺盛で、在圃性に優れる。



好評


あおなみ

コート 5000 粒 砂土質 粘土質

■ 1月～3月中旬どり

品種特徴

- 8月15日～9月5日播き、1月中旬～3月中旬収穫。
- 草勢は強く、耐寒性、在圃性に優れる。
- 球色は極濃緑色で厳寒期でもアントシアンの発生が少ない。
- 形状はやや厚みのある平玉で、晩抽性に優れる。





ばんちゅう


晩抽みつき

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質



■ 2 月中旬～ 3 月下旬どり

- 8 月下旬播き、2 月中旬～ 3 月下旬収穫。
- 耐寒性に優れ、アントシアンの発生が少ない。
- 晩抽性で、芯のびが極めて遅い。
- 在圃性に優れ、L 玉出荷できる期間が長い。




ゆいな

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質



■ 2 月中旬～ 3 月どり

- 9 月 5 日～ 9 月 25 日播き、2 月中旬～ 3 月収穫。
- イオウ病抵抗性 (A タイプ) を持ち、腐敗性の病害に強く、在圃性に優れる。
- 形状は甲高扁円球、上昇気温下でも形状安定性に優れる。



菌核病の防除について

年明け収穫の作型では菌核病防除を徹底しましょう！



症状

- 結球期以降に、下葉に水浸状の不規則な病斑を生じる。進行が進むと結球部全体が黒褐色に腐敗し、最終的にネズミの糞状の菌核を形成する。

原因

- かびの仲間が原因とされ、土中に残った菌核が数年間感染源となり、菌核は 10℃～20℃の過湿条件が続くと直接菌糸を発芽させ感染する。また、地表にキノコを形成し、そこから胞子を飛散させることによっても感染する。

対策

- 定植後、株間が塞ぎきらない時期に薬剤散布を行う。
- 排水性を改善する。
- 発病株は圃場外へ廃棄する。

キャベツ菌核病のオススメ防除方法

パレード 20 フロアブル×ラッソー乳剤

定植後のラッソー散布にパレード 2000 倍を混用することで、省力化しながら菌核病の初期予防ができる。




TS-100

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質

■ 3 月～ 4 月どり

- 9 月 15 日～ 25 日播き、3 月中旬～ 下旬収穫。
- 10 月 5 日～ 15 日播き、4 月上旬～ 中旬収穫。
- 球色は鮮緑色で球面のアントシアンの発生が少ない。
- 葉質は柔らかく多汁で品質は良好。
- 早春どりで安定した形状に仕上がる。




わかづま 若妻

コート 5000 粒 生種 3000 粒 砂土質 粘土質

■ 4 月上旬～ 5 月上旬どり

- 10 月上旬播き、4 月上旬収穫の極早生品種。
- 球はやや甲高扁円球になる。
- 若女将より 1 週間ほど早生になり、食味がよい。
- 外葉は開張性で球はやや黄葉系。




わかおかみ 若女将

コート 5000 粒 生種 3000 粒 砂土質 粘土質

■ 4 月中旬～ 5 月どり

- 10 月上旬播き、4 月中旬収穫。
- やや扁円球で裂球が遅いタイプ。
- 外葉はコンパクトで開張性になり、揃いが良い。
- 土質を選ばず、栽培適応性が高い。





ナカガミのタネ

ときめき

コート 5000 粒

生種 2000 粒

砂土質

粘土質


■ 11 月中旬～12 月中旬播き、
5 月上旬～5 月中旬どり

品種特徴

- 玉の形状が良く、重量のりが良い品種。
- 黒腐病にも強く、各種の微量元素欠乏症に高い耐性がある。
- 肥大性が良く、揃った収穫が見込める。
- 球色は鮮緑色でアントシアンの発生が少ない。

栽培ポイント

- 早生品種のため、株間は30cm以上とする。
- 早播きは尖玉や抽苔の原因となるので注意する。



好評

ナカガミのタネ

すいれん 翠恋

コート 5000 粒

生種 2000 粒

砂土質

粘土質


■ 12 月下旬～2 月播き、
5 月下旬～6 月どり

品種特徴

- 尖り玉になりにくく、形状安定性に優れる。
- パーティシリウム萎凋病に耐性がある。
- 球締りも良く、在圃性に優れる。

栽培ポイント

- やや多肥を好むので、施肥は慣行と同程度または1～2割増とする。



好評

はつ夏^{なつ}

コート 5000 粒

生種 2000 粒


砂土質

粘土質



■ 10 月下旬～11 月下旬播き、4 月下旬～5 月中旬どり

- 球は光沢のある鮮緑色の中早生品種。
- 球形は扁円形に安定する。
- 10 月 20 日以降の播種で4 月下旬より収穫できる。
- 早播きすると抽苔の原因となるので注意する。

初夏^{しよか} 9009

コート 5000 粒

生種 2000 粒


砂土質

粘土質



■ 10 月下旬～11 月下旬播き、5 月中旬～6 月上旬どり

- 草勢は強く球肥大が良い。
- 年内定植でも脇芽の発生が少ない。
- 裂球が遅く、在圃性に優れる。



ことみ

コート 5000 粒

生種 2500 粒


砂土質

粘土質



■ 10 月下旬～11 月中旬播き、5 月上旬～5 月下旬どり

- 球形は、やや甲高の扁円球。
- 外葉はコンパクトなので、密植栽培が可能。
- 濃緑色で、葉肉が厚いので業務加工にも向く。
- 年内に定植すると抽苔の原因となるので注意する。

初恋^{はつこい}

コート 5000 粒

生種 3000 粒

砂土質

粘土質



■ 12 月下旬～2 月下旬播き、5 月下旬～6 月どり

- 扁円球で、球揃いが良いため一斉収穫ができる。
- 裂球が極めて遅く在圃性が高い。
- イオウ病、黒腐病、腐敗系の病気に強い。
- 食味は歯切れ良く生食にも最適。






かい りょう あ い き
改良愛輝

コート 5000 粒 生種 3000 粒 砂土質 粘土質



■ 1 月上旬～3 月播き、5 月下旬～ 6 月どり

- 草勢はやや強く、球肥大性に優れる。
- 尖り球になりにくく、球形が安定する。
- イオウ病に強く、重量のりが良い。




なつおこ

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質



■ 12 月上旬～ 1 月中旬播き、5 月下旬～ 6 月下旬どり

- 外葉は青緑色で葉数数が多く、ワックスが強いので病害虫に強い。
- 草勢は旺盛で、球伸びも良い。
- 在圃性に優れ、大玉になっても裂球が少ない。




れ ん ぶ
恋舞

コート 5000 粒 生種 3000 粒 砂土質 粘土質



■ 12 月下旬～2 月中旬播き、5 月下旬～ 6 月どり

- 草姿は立性で揃いが良く、株の倒れが少ない。
- 球色は濃緑で尖り球になりにくく、球形が安定する。
- イオウ病に強く、在圃性に優れる。




て る か ぜ
輝風

コート 5000 粒 生種 2000 粒 砂土質 粘土質



■ 1 月上旬～ 2 月下旬播き、6 月どり

- 結球後の在圃性に優れ、収穫期の幅が広い。
- 球色は濃緑でツヤがある。
- 肥大性と晩抽性に優れる中早生品種。
- 高温期にも腐りが少ない。



キャベツ作型表

収 穫 期		品 種 名	播 種 期
春 系	年内～ 1 月	YR 福春・ゴールド福春・YR はな岬・はま吉・花かぐらはるなぎエース・さちぞら・ゆずな・きよな・花いぶき	8/1 ～ 8/15
	1 月～ 2 月	YR 福春・さちぞら・さちはる・YR 太陽・まいぞめさきがけ・きよな・YR はな岬・YR 京春	8/15 ～ 8/25
	2 月～ 3 月	さきがけ・さちなみ・春岬・YR 太陽・まいぞめはるみち・YR 京春・あおなみ	8/25 ～ 9/3
	3 月～ 4 月	春錦・晩抽みつき・ゆいな	8/25 ～ 9/5
寒 玉	10 月～ 12 月	いろどり・早生光・YR しぶき・YR しわす・天陽 YR886・YR888・なみかぜ・藍天・味球	7/25 ～ 8/3
	11 月～ 12 月	YR しわす・YR886・なみかぜ・輝風・藍宝 YR しぶき 2 号・ふゆか・YR なごみ・ロイド	8/3 ～ 8/10
	12 月～ 1 月	CT みかさ・冬こづち・秋よし 2 号・藍宝ひかり・冬藍 円楽・YR かな・YRC ふゆいろ・冬きらり 翠緑・YR つむぎ・YR そうてん・風あすか・冬魂	
	1 月～ 2 月	冬こづち・銀次郎・冬まどか・そらと・YR たかみね YR かな・冬銀河・YR むつき・YR あにき YCR きよまさ・YR 冬なぎ・風あすか・風みやこ 冬武将	8/10 ～ 8/15
	2 月	冬こづち・銀次郎・冬まどか・そらと・ふゆき 冬五郎・YR たかみね・りくと・雪風・YR むつき YCR きよまさ・YR あにき・風みやこ・冬武将	8/15 ～ 8/20
	2 月～ 3 月	冬五郎・強力まどか・ふゆき・晩抽かんだ 青龍 345・深雪・YR たかみね・りくと・りくよう 龍溪	8/20 ～ 8/25
春・初夏どりキャベツ	3 月～ 5 月	冬のぼり・青龍 345・りくよう・晩抽かんだ・龍溪 えんよう・冬はるか	8/20 ～ 8/30
	4 月～ 5 月	ゆいな・若妻・TS-100・若女将・金系 201	10 月～ 11 月
	5 月～ 6 月	新若夏・さつき女王・ときめき・はつ夏 初夏 9009・かんろく・ことみ	10 月下～ 11 月下
	6 月	中生 SE・夏いち・輝風・初恋※(12 月下旬～) きよはる・翠恋・改良愛輝	11 月下～ 1 月

※初恋は早播きに注意


ナカガミのタネ フォワード (KS-21)

コート 5000 粒 生種 2000 粒

■ 10 月下旬～ 11 月どり 春どり可能

病害の発生が少なく、花蕾品質の良い早生品種

- 品種特徴
- 播種後 90 日程度で収穫できる早生品種。
 - 草姿は半立性で、樹勢は中程度。
 - 花蕾の品質が高く、形状安定に優れている。
 - 黒すす病や黒腐れ病に強いいため、安定した収穫が見込める。
 - 高温下での死花の発生にも耐性がある。




ナカガミのタネ ウイニング (KS-2020)

コート 5000 粒 生種 2000 粒

■ 11 月上旬～ 12 月どり 春どり可能

栽培容易な年内どり早生品種

- 品種特徴
- 播種後 85～90 日で収穫できる早生品種。
 - 花蕾の盛り良く、スムーズなドーム状となり、締りが良い。
 - 草姿は立性で収穫作業性に優れている。
 - 樹勢が強いため追肥を主体として管理する。
 - 温度上昇期も花蕾が乱れにくく、春まき栽培にも向く。




きぼう (BL-456)

コート 5000 粒

■ 11 月～ 12 月どり

生育、収穫の揃いが良い早生品種

- 品種特徴
- 播種後 90～95 日程度で収穫できる早生品種。
 - 花蕾形状はスムーズなドーム型で、蕾粒の揃いが良い。
 - 草姿は半開帳性で、ややコンパクト。



株数 (10a) 4,500 ～ 6,000 株

は種量 (10a) 20ml × 3 ～ 4 袋 コート 1 ～ 2 缶


クルーニー (YQQ649)

コート 5000 粒

■ 10 月下旬～ 11 月どり

高品質花蕾の極早生品種

- 品種特徴
- 播種後 85 日前後で収穫できる極早生品種
 - 花蕾の締まり良く、細粒のドーム状となる。
 - 低温期はアントシアンが強く発色するので注意する。




ガルベス (YQQ648)

コート 5000 粒

■ 10 月下旬～ 11 月どり 春どり可能

耐暑性に優れる早生品種

- 品種特徴
- 播種後 93 日前後で収穫できる早生品種。
 - 花蕾は濃緑色で廃ドームな花蕾が収穫できる。
 - 耐病性、耐暑性、肥大性に優れる。




ベルクレスト (NX-BB304)

コート 5000 粒

■ 11 月中旬～ 12 月どり

花蕾粒の揃いが優れる中早生品種

- 品種特徴
- 播種後 100 日で収穫できる中早生品種。
 - 草姿はやや立性でコンパクトなため栽培管理が容易。
 - 粒ぞろいが良く、花蕾形状が安定する。




～根こぶ病耐病性品種～

CR ルイス

コート 5000 粒

■ 11 月上旬～ 12 月上旬どり

- 品種特徴
- 播種後 90 日程度で収穫できる早生種。
 - 草姿は開張性で、草勢は中程度。
 - 耐暑性に優れ、死花やキャッツアイの発生が少ない。




MKS-B101

コート 5000 粒

生種 2000 粒

■ 11 月～ 12 月どり

- 品種特徴
- 播種後 90 日程度で収穫できる早生種。
 - 草姿は半開張性で、草勢は中位でコンパクト。
 - 花蕾は濃緑色で締りと盛りが良い。
 - アントシアンの発生は比較的遅い。




グリーンキャノン

コート 5000 粒

生種 2000 粒

■ 11 月～ 12 月どり

- 品種特徴
- 播種後 110 日程度で収穫できる中生種。
 - 草姿は立性で、草勢は中程度。
 - 側枝の発生は少ない。
 - 花蕾は小粒で濃緑色、形の良いドーム型で締りも良い。
 - 花蕾腐敗病とアントシアンに注意。



～根こぶ病耐病性品種～

緑竜 (BL-649)

コート 5000 粒


生種 2000 粒



■ 11 月中旬～ 12 月どり

春どり可能

- 品種特徴
- 播種後 105 日程度で収穫できる中生種。
 - 花蕾形状は重量感のあるドーム型で締りが良い。
 - 草姿は半開張性で、花蕾位置が低く倒伏しにくい。
 - 厳寒期には花蕾にアントシアンが着色する。




BL-462

コート 5000 粒



■ 12 月～ 1 月どり

- 品種特徴
- 播種後 100 日程度で収穫できる中早生種。
 - 花蕾の形状は、ボリュームのあるスムーズなドーム型。
 - 草姿は半開張性でアントシアンの発生はない。



CR 夢剛力 (NBR-25)


コート 5000 粒

生種 2000 粒



■ 11 月下旬～ 12 月どり

- 品種特徴
- 播種後 100 日で収穫できる中早生品種。
 - 花蕾の締まりが良く、収穫適期を過ぎても花蕾形状が乱れない。
 - 花蕾の肥大性が良いので業務加工用にも向く。



深碧 (BL-650)


コート 5000 粒

生種 2000 粒



■ 1 月～ 2 月どり

- 品種特徴
- 播種後 120 日程度で収穫できる中生種。
 - 花蕾形状はドーム型で締りが良く肥大性に優れる。
 - 草姿は半開張性で根の張りが強く、土壌に対する適応性が広い。



～アントシアンレス品種～


ファイター

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 11 月～ 12 月どり 春どり可能

- 品種特徴
- 播種後 95 日程度で収穫できる早生種。
 - 花蕾の形状良く、濃緑色でボリュームがある。
 - 草姿は立性で、側枝の発生は少なく栽培管理が容易。
 - 冬どりでは作型を広くすることが可能。




サミット (BL-648)

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 11 月～ 12 月どり 春どり可能

- 品種特徴
- 播種後 115 日程度で収穫できる中生種。
 - 花蕾はボリュームのあるドーム型。
 - 高温下でも花蕾形状が安定し、死花の発生も比較的少ない。




ベルネ

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 12 月～ 1 月どり 春どり可能

- 品種特徴
- 播種後 95 日程度で収穫できる早生種。
 - 草姿は極立性で草勢はやや強い。
 - 花蕾は小粒、濃緑色でドーム型。




ルミナス (BL-652)

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 12 月～ 1 月どり

- 品種特徴
- 播種後 105 日～110 日程度の中早生種。
 - 草姿は立性で花蕾位置はやや高く、葉枚数が少ないため収穫作業性に優れる。
 - 花蕾は濃緑色で、締りの良い豊円形となる。



株数 (10a) 4,500 ～ 6,000 株

は種量 (10a) 20ml × 3 ～ 4 袋 コート 1 ～ 2 缶

～アントシアンレス品種～


バンベル

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 12 月～ 1 月どり

- 品種特徴
- 播種後 105 日程度で収穫できる中生種。
 - 花蕾はベルネと同様の濃緑色。
 - 小粒で締りも良く安定したドーム形状に仕上がる。
 - 草姿は立性で、馬力はベルネより強め。




アーサー (BL-646)

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 12 月～ 2 月どり

- 品種特徴
- 播種後 115 日程度で収穫できる中生種。
 - 花蕾の形状は厚みのある豊円形で、花粒は細かく締りが良い。
 - 草姿は半開張性で花蕾位置はやや低い。




プライム (BL-453)

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 12 月下旬～ 1 月どり 春どり可能

- 品種特徴
- 播種後 95 日～100 日程度で収穫できる早生種。
 - 花蕾形状はスムーズなドーム型で締りが良い。
 - 草姿は半開張性で、コンパクトな草丈となる。




BL-654

コート 5000 粒



■ 1 月～ 2 月中旬どり

- 品種特徴
- 播種後 120 日程度で収穫できる中生種。
 - 花蕾は濃緑色で締りの良い豊円型。
 - 草姿は半立性で、花蕾位置はやや高い。



～アントシアンレス品種～


はつみらい (N-82)

コート 5000 粒 生種 2500 粒



■ 12月～2月どり

- 品種特徴**
- 低温期においても花蕾の肥大がしやすい中早生種。
 - 草姿は、立性で花蕾の位置が高めで収穫作業性に優れる。
 - 花蕾は形の良いドーム型で濃緑色。



ゆめみなみ (N-394)

コート 5000 粒 生種 2500 粒



■ 1月～2月どり

- 品種特徴**
- 定植時期が10月以降になると草丈が低くなり収穫作業性が悪くなるので適期定植をする。
 - 草勢がやや弱いのでスムーズな活着を心がける。また、排水条件の悪い圃場での栽培は避ける。




ブロッケン W

コート 5000 粒



■ 1月～2月どり

- 品種特徴**
- 低温条件での肥大性・花蕾品質に優れ、綺麗なドーム型となる。
 - 厳寒期の収穫においても、白ずみの少ない鮮緑色の花蕾となる。




クリア (BL-819)

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 1月～3月どり

- 品種特徴**
- 播種後150日程度で収穫できる晩生種。
 - 茎は太く草姿は半開張性。
 - 花蕾は濃緑色でボリュームのあるドーム型。




ボルト

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 11月上旬～12月上旬どり 春どり可能

- 品種特徴**
- 播種後85日程度で収穫できる早生種。
 - 耐暑性に優れ収穫揃いが良い。
 - 花蕾は濃緑色、草勢は中程度で草姿は立性。




デリシャスドーム

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 11月上旬～12月中旬どり 春どり可能

- 品種特徴**
- 播種後95日程度で収穫できる中早生種。
 - 花蕾は濃緑色で、粒揃いが良い。
 - 花蕾位置が高く、収穫作業が容易。




サマードーム

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 11月どり 春どり可能

- 品種特徴**
- 播種後100日～110日程度で収穫できる中生種。
 - 草姿は極立性で草勢強く、耐暑性に優れる。
 - 花蕾はスムーズな豊円で、締り良く色鮮やか。




ブロッケン HP

コート 5000 粒



■ 11月上旬～12月上旬どり

- 品種特徴**
- 播種後90日程度で収穫できる中早生種。
 - 花蕾の締り良く、ピーズはきめ細やか。
 - 高温期でも高品質の花蕾が収穫できる。






恵麟

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 11 月上旬～ 12 月中旬どり 春どり可能

- 品種特徴
- 播種後 105 日程度で収穫できる中早生種。
 - 茎穴の発生が少なく、また柔らかく収穫しやすい。
 - 花蕾は締り抜群で収穫揃いが良い。




まどか

コート 5000 粒 生種 20ml



■ 11 月～ 12 月どり 春どり可能

- 品種特徴
- 播種後 105 日～110 日程度で収穫できる中早生種。
 - 側枝の発生はほとんどなく、草姿は半開張性。
 - 厳寒期にはアントシアンが発生するので注意する。




グリーンデルタ

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 11 月～ 12 月どり 春どり可能

- 品種特徴
- 播種後 95 日程度で収穫できる早生種。
 - 花蕾は濃緑色で、粒揃いと締りが良い。
 - 花蕾位置が高く、揃いが良いので収穫作業性が良い。




令麟 (TSX-703)

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 11 月～ 12 月どり 春どり可能

- 品種特徴
- 播種後 100 日程度で収穫できる中早生種。
 - 耐暑性に優れキャッツアイや死花の発生が少ない。
 - 花蕾に発生する病気に耐病性がある。
 - 側枝の発生は少ない。




和麟 (TSX-706)

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 11 月～ 12 月どり 春どり可能

- 品種特徴
- 播種後 110 日程度で収穫できる中生種。
 - 草姿は立性で馬力があり、根張りが強く湿害に強い。
 - 花蕾は濃緑色のドーム型で締りが良い。
 - 組織内べと病に耐病性を持つ。




あさひ 3 号

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 12 月上旬～ 1 月上旬どり

- 品種特徴
- 播種後 120 日程度で収穫できる中生種。
 - 根張りが強く、花蕾形状は抜群。
 - アントシアンが出る品種なので 1 月中旬までの収穫に努める。



インパクト


コート 5000 粒 生種 2000 粒



好評

■ 11 月中旬～ 1 月中旬どり 春どり可能

- 品種特徴
- 播種後 100 日程度で収穫できる中早生種。
 - 濃い色のドーム状花蕾になる。
 - 草姿は立性で、葉枚数が少ないため収穫作業性に優れる。




蒼麟 (TSX-026)

コート 5000 粒 生種 2000 粒



■ 12 月～ 1 月どり

- 品種特徴
- 播種後 120 日ほどで収穫できる中生種。
 - 草姿はやや開張性で、草勢はやや旺盛。
 - 花蕾は極濃緑色で盛りと締りの良いドーム型。
 - 組織内べと病や黒すす病の発生が少ない。




ナカガミのタネ ハイランド

コート 5000 粒



■ 12月下旬～1月どり 春どり可能

- 品種特徴**
- 播種後90日～95日程度で収穫できる早生品種。
 - 花蕾の色が濃く、締りと盛りがともに良い。
 - 花蕾の締りは良く、形状安定性に優れる。




ゆう りん
勇麟

コート 5000 粒



■ 1月～2月どり

- 品種特徴**
- 播種後130日前後で収穫できる晩生品種。
 - 花蕾は濃緑色のドーム形状で盛りと締まりが良い。
 - 草姿はやや立性で草勢は旺盛。



ナカガミのタネ たかみどり


コート 5000 粒

生種 2000 粒



■ 12月下旬～2月どり

- 品種特徴**
- 播種後125日程度で収穫できる中生種。
 - 草姿は半開張性で、側枝の発生は少ない。
 - 花蕾色が濃いのでアントシアンが発生しても目立ちにくい。



むつみ

コート 5000 粒

生種 2000 粒



■ 12月中旬～2月中旬どり

- 品種特徴**
- 播種後125日程度で収穫できる中生種。
 - 草姿は立性で花蕾位置はやや低い。
 - 花蕾はボリュームがあり、茎が太く収量性が高い。
 - 厳寒期には花蕾にアントシアンがやや発生する。



ともえ (BL-815)


コート 5000 粒

生種 20ml



■ 1月～3月どり

- 品種特徴**
- 播種後140日程度で収穫できる中晩生種。
 - 草姿は半開張性で側枝の発生は中程度。
 - 耐寒性・低温伸長性に優れ、年明け収穫に向く。
 - 花蕾は豊円形となり締りが良く、粒は細かく揃う。



すずか (BL-818)


コート 5000 粒

生種 2000 粒



■ 3月～4月上旬どり

- 品種特徴**
- 播種後200日程度で収穫できる極晩生種。
 - 草姿は立性、生育旺盛で耐寒性がある。
 - 花蕾の締りがよく、3月以降の気温上昇期でも花蕾が緩みにくい。



ブルガ


コート 5000 粒

生種 2000 粒



■ 1月～3月上旬どり

- 品種特徴**
- 播種後150日程度で収穫できる晩生種。
 - 花蕾はスムーズなドーム型で見栄えが良い。
 - 花蕾粒は小粒で揃いがよく、花蕾の締りが良い。
 - 葉べト病に耐病性を持つ。



はるびより (N-435)


コート 5000 粒

生種 2500 粒



■ 3月下旬～4月上旬どり

- 品種特徴**
- 草姿は立性で、側枝の発生も少なくコンパクトに仕上がる。
 - 花蕾は細粒のドーム型となる。
 - 茎は適度な太さで、空洞の発生もほとんどない。






おくみどり 晩緑99W

コート 5000 粒 生種 20mℓ

3 月下旬～ 4 月上旬どり

- 草姿は立性、外葉は濃緑色で栽培容易。
- 花蕾は濃緑色、表面はなめらかで粒揃いよく、色合い、形状が良い。また、この時期の物としては緩みも遅い。




ゆめさくら (N-475)

コート 5000 粒 生種 2000 粒

3 月～ 4 月どり

- 草姿は立性で花粒は細かく盛りが良く、この時期の収穫物としては重量がある。
- 花蕾の緩みも比較的遅いため収穫幅がもてる。




おくみどり 晩緑105 (N-105)

コート 5000 粒 生種 2500 粒

4 月中下旬どり

- 晩緑 100 の後に収穫可能。
- 9 月播きで、春の端境期に収穫できる極晩生種。




ふゆしほう 冬紫宝

生種 小袋

3 月～ 4 月どり


- 端境期の3月～4月に収穫できる晩生のスティックブロッコリー。
- 花蕾は茹でると緑色に変化する。
- 茎は柔らかく甘みがある。



ブロッローレ 65

コート 1000 粒 生種 200 粒

- カリブローレのように茎が伸びるブロッコリー。
- 従来のスティックブロッコリーと異なり一発収穫が可能のため作業効率が非常に良い。
- 耐暑性があり、夏播き・春播きができる。



ブロッローレ 65




ブロッローレ 80

ブロッローレ 80

コート 1000 粒 生種 200 粒

- 定植後約80日で収穫できるタイプ。
- 鮮やかな緑色で、日持ちも良好。




スティックセニョール

コート 5000 粒 生種 2000 粒

11 月～ 12 月どり

- 播種後90日程度で頂花蕾を収穫後15本前後の小型側花蕾が収穫できる茎ブロッコリー。
- 草姿は立性で、草丈は55cm前後。
- 茎を食べるブロッコリーで、茎は柔らかく食味が良いので直売所出荷や家庭菜園にもおすすめ。



ホウ素欠乏症の予防になる

さくばたけ
ホウ作畑

ホウ素欠乏症の予防

ホウ素の含有率が低い圃場でブロッコリーを栽培すると、生育が悪くなります。葉が黄化し始めるのと同時に葉柄部や茎部の表皮にかさぶた状の症状が発現し、生育が進むにつれ茎部全体に広がり壊死した状態となります。ホウ素欠乏が発生してからの治療では手遅れになります。生育初期から収穫期までホウ素が絶えず供給されることが必要です。

- 「ホウ作畑」には、窒素・リン酸・カリ・石灰以外の農作物が必要とする成分が全て含まれています。
- 「ホウ作畑」に含まれる成分は、水溶性なので農作物によく吸収されます。
Mg：13.5% Mn：0.4% B：1% 10aあたり2～3袋



▲ホウ素欠乏症のブロッコリー

ホウ素の要求の多いアブラナ科作物の為に作られた、ホウ素強化型のミネラル肥料



黒すす病について

- 花蕾および葉柄、葉に発生する。(写真参照)
- 苗に発生すると、地際部が褐変、腐敗し、立ち枯れ症状を起こす。
- 9月～10月に発生する病気で、高温多湿で発生が多くなる。
- 発病適温は20℃～25℃程度で、降雨と強風により発病が多くなる。
- 病原菌は被害植物上で生存し、胞子により空気伝染する。
- 残渣と共に土壌中で生存するため、次作でも発生の可能性がある。



根こぶ病軽減 CR-1 大根（おとり大根）

■根こぶ病について

根こぶ病菌は作物の根に侵入して感染することによって、細胞の異常増殖を起こしてこぶを形成します。それと同時に、地上部への養水分の供給が困難となります。その後、休眠胞子が非常に多数形成され土中に分散します。この胞子は通常5～7年土壌中に生存し、これが根こぶ病防除を困難にしている一つの原因です。

■CR-1の利用法

CR-1は土壌中の根こぶ病の菌密度を1/10～1/100以下に減少させる効果がある大根です。この大根は根こぶ病菌に感染するものの細胞が異常増殖せず、こぶ(休眠胞子)が形成できないことによって菌密度が低下していきます。

1. 作物の定植2ヶ月前までにCR-1を播種します。
2. 播種後1ヶ月してからトラクターですき込みます。
3. すき込み後1ヶ月以上たってから作物を定植します。

必要種子量 10アール当たり6～8リットル



ブロッコリー作型表

収穫期	品 種 名	播種期
11 月	ボルト、グリーンデルタ、恵麟、サマードーム、令麟、和麟、ブロッケンHP、フォワード、ガルベス	7/25 ～ 8/5
11 月～ 12 月	CRルイス、MKS-B101、デリシャスドーム、インパクト、BL-462、まどか、緑竜、グリーンキャノン、ファイター、ブロッケン、蒼麟、フォワード、ウイニング、きぼう、ガルベス、ベルクレスト	8/5 ～ 8/15
12 月～ 1 月	あさひ3号、たかみどり、プライム、ファイター、ベルネ、インパクト、ルミナス、グランドーム、はつみらい、サミット、ユルガン、ウイニング、勇麟	8/15 ～ 8/25
1 月～ 2 月	たかみどり、むつみ、アーサー、ベルネ、BL-654、バンベル、ともえ、ブルガ、ブロッケンW、はつみらい、ゆめみなみ、グリーンマッシュ、ドームツリー、美緑410、ハイランド、インパクト、、勇麟	8/25 ～ 8/30
2 月～ 3 月	むつみ、ともえ、クリア、マルス、グリーンライガ	8/30 ～ 9/5
3 月～ 4 月	すずか、晩緑95、晩緑99W、晩緑100、はるびより(N-435)、ゆめさくら、晩緑105	9/5 ～ 9/15

※詳しい播種期、収穫期は品種ごとの作型表を参考にしてください。

その他有望品種

ブロッケン11 月～ 1 月どり

- 播種後 90 日で収穫できる早生種。

ブランカ11 月～ 12 月どり

- 播種後、95 日前後で収穫できる早生種。

グランドーム12 月～ 1 月どり

- 播種後 120 日程度で収穫できる中晩生種。

美緑 41012 月～ 1 月どり

- 茎が太く生育旺盛な中早生種。

グリーンマッシュ12 月～ 1 月どり

- 播種後 120 日程度で収穫できる中早生種。

ドームツリー1 月～ 2 月どり

- 播種後 120 日程度で収穫できる中早生種。

グリーンライガ2 月～ 3 月どり

- 播種後 150 日程度で収穫できる晩生種。

マルス2 月～ 3 月どり

- 播種後 180 日程度で収穫できる晩生種。

晩緑 953 月どり

- 晩緑 99W よりも早くから収穫できる。

晩緑 1004 月上旬どり

- 晩緑 99W の後に収穫可能な極晩生種。

春ブロッコリー作型表

品種名	播種日	定植日	収穫日
恵麟	11/ 中～12/ 下	1/ 上～2/ 中	4/ 中～5/ 上
プライム	11/ 下～12/ 下	1/ 中～2/ 中	4/ 下～5/ 中
ファイター	11/ 下～12/ 下	1/ 中～2/ 下	4/ 下～5/ 中
まどか	11/ 下～12/ 下	1/ 中～2/ 下	4/ 下～5/ 中
緑竜	11/ 下～12/ 下	1/ 中～2/ 下	4/ 下～5/ 中
インパクト	12/ 下～2/ 上	1/ 中～2/ 下	5/ 上～5/ 中
令麟	11/ 下～12/ 下	1/ 中～2/ 下	5/ 上～5/ 中
ハイランド	12/ 下～2/ 上	1/ 下～2/ 中	5/ 上～5/ 下
ウイニング	1/ 上～2/ 上	1/ 下～2/ 下	5/ 中～5/ 下
フォワード	1/ 上～2/ 上	1/ 下～2/ 下	5/ 中～5/ 下
ベルネ	1/ 上～2/ 上	2/ 下～3/ 上	5/ 中～5/ 下
サミット	12/ 上～1/ 中	1/ 下～2/ 下	5/ 中～5/ 下
グリーンデルタ	1/ 上～2/ 上	2/ 下～3/ 下	5/ 中～5/ 下
ボルト	1/ 上～2/ 上	2/ 下～3/ 下	5/ 下～6/ 上
サマードーム	1/ 上～2/ 上	2/ 下～3/ 下	5/ 下～6/ 上

※天候や肥培管理等で収穫時期は変動します。

※より詳しい作型・特性を知りたい方は、店舗または営業担当までお問い合わせください。

PVA べたがけ資材 バロン愛菜NEO

用 途：
保温、防霜、冷害防止

対象作物：
レタス、ハクサイ、馬鈴薯、ネギ、
ブロッコリー、セルリー、茶 等


素 材：
EVOH フィルム
ポリエチレン系

露地野菜の
成長を助ける
被覆資材！

使用事例ブロッコリー（愛知県内）2月8日定植 4月5日撮影



露地（対象区）とバロン愛菜 NEO の比較
（生育の差が明らかにわかります）



バロン愛菜 NEO は保温力があるため
トンネル栽培からべたがけ栽培へ変更が可能です

！ 要注意 ！ 根こぶ病が増えています！

根こぶ病とは

症 状

根に大小の「こぶ」を生じる。
根からの水分・養分の吸収が阻害され、生育不良や晴天時の株全体の萎れ、結球不良等を招き、生育初期に罹病した場合は枯死することもある。

原 因

病原菌： *Plasmodiophora brassicae* WORONIN
糸状菌の一種で、一度発生すると土壤中に休眠孢子として長期間残存する。適当な温度と水分、宿主がそろって遊走子を形成し、宿主根にたどり着き感染する。感染後は宿主根の細胞中で増殖・充満・休眠孢子を形成し、その過程で大きな「こぶ」を作る。

条 件

土壌水分：遊走子によって土壌の水分中を遊泳するため、排水の悪い圃場で多発する。
温 度：20℃～24℃が最適温度で、日照時間が長くと発生が増えるため、春・初秋に多発傾向。
土壌酸度：pH4.5～6.5の酸性土壌で発生し、pH6.5以上の中性～アルカリ性では激減する。



根こぶ病を発症したブロッコリーの根



根こぶ病 発生圃場



萎れたキャベツ

根こぶ病被害を抑えるためには

- 石灰資材等による**土壌 pH の矯正**（pH6.5 以上）
- 登録農薬による**土壌消毒・防除**の徹底
- 根こぶ病**耐病性品種**の利用
- 作付け時期**の検討
- おとり作物**（おとり大根・ヘイオーツ等）の**利用による菌密度低減**


うずまき ER

コート 1000 粒・50 粒



11月～3月どり

- 品種特徴**
- 外葉は濃緑色で立性、草勢強く生育旺盛。
 - 花蕾は黄緑色で先のとがったスパイラル状となる。
 - 耐暑・耐寒性に優れ丈夫で作りやすく、花蕾の緩みも遅く長期にわたり収穫できる。



カリフローレ 60/70/80/90

コート 2500 粒・1000 粒

生種 200 粒



- 品種特徴**
- 花茎が柔らかく甘いスティック状のカリフラワー。
 - 耐暑性に優れ、生育旺盛で栽培しやすい。
 - 花蕾は白く緻密で、よく盛り上がった形状となり、重量感がある。

- 適作型**
- 60：耐暑性があり、夏播きの年内収穫におすすめ。
 - 80：低温に鈍感。トンネル栽培で冬播きの5月～6月収穫にも適応。周年供給におすすめ。


ダ・ヴィンチ

コート 2500 粒・1000 粒・50 粒



12月～2月どり

- 品種特徴**
- 草勢は旺盛で、耐寒性も強く栽培容易。
 - 花蕾は鮮やかな黄緑色となり、盛り上がりにより見栄えが良い。



その他ロマネスコ品種／うずまき E、ユーロスター

紫カリフローレ70/80


コート 1000 粒

生種 200 粒



10月下旬～11月どり

- 品種特徴**
- カリフローレの紫タイプ品種。
 - 幅広い作型で収穫可能だが、寒さには強くないため秋冬作の遅播きは避ける。
 - 花蕾がばらけ始め、隙間が出来てきたら収穫適期。



株数 (10a) 4,000～5,000 株

は種量 (10a)

20ml×3袋 コート 1～2缶

オレンジルナ 28

コート 1000 粒



12月～3月どり

- 品種特徴**
- 草勢が強く、耐寒性があり栽培しやすい。
 - 花蕾は整ったドーム型。
 - 8月上中旬播きで、12月下旬～1月収穫でき、8月下旬播きで、2～3月収穫できる。

その他オレンジ品種／オレンジステラ (NOR-18)・オレンジ美星・オレンジブーケ

オーナメントパープル

生種 1000 粒



11月～12月どり

- 品種特徴**
- 定植後70日程度で収穫できる早生品種。
 - 草勢は中程度で、草姿は立性。
 - 鮮やかな紫色で、盛りのある花蕾が収穫できる。
 - 茹でると群青色に変わり、茹でる際に食酢を加えると鮮やかな赤紫色になる。

パープルルナ 77

コート 1000 粒



11月～1月どり

- 品種特徴**
- 鮮やかな紫色のカリフラワー。湯がいても花蕾は紫色で料理のいどりに向く。
 - 8月上中旬播きで、12月上旬収穫でき、8月下旬播きで、1月収穫できる。

きみどり君^{くん}

生種 1000 粒・小袋



12月～2月どり

- 品種特徴**
- 定植後110日程度で収穫できる黄緑色のカリフラワー。
 - 草姿は立性で耐寒性が強く、根張りも良く栽培しやすい。
 - 茹でても変色せず鮮やかな黄緑色なので料理の付け合わせに最適。食味も良好。

その他品種／マルケ




こい 恋うさぎ

コート 5000 粒 生種 2000 粒

10月～11月どり

- 品種特徴**
- 定植後65日前後で収穫できる早生種。
 - 花蕾は純白で締り良く厚い。
 - 草勢は旺盛で、草姿は立性。
 - 7月中旬～8月上旬播きで、10月中旬～11月中旬収穫に適する。




ゆき 雪みね

コート 5000 粒 生種 2000 粒

11月～12月どり

- 品種特徴**
- 耐暑性に優れ、生育旺盛で栽培しやすい。
 - 草姿は立性で、外葉の包葉が強い。
 - 花蕾は純白でドーム型となる。
 - 7月下旬～8月上旬播きで、11月上旬～12月中旬収穫に適する。




ゆき 雪まつり

コート 5000 粒 生種 20ml

10月～11月どり

- 品種特徴**
- 定植後約65日で収穫できる早生種。
 - 花蕾は白色で、豊円形で盛り上がり良く、凹凸が少なくきめ細かい。
 - 異常花蕾の発生が少なく品質良好で、湿害に強い。




ぶき まり月

コート 5000 粒 生種 2500 粒

10月～11月どり

- 品種特徴**
- 耐暑性に優れ、生育旺盛で栽培しやすい。
 - 花蕾は白く緻密で、よく盛り上がった形状となり、重量感がある。
 - 一般平暖地では7月中下旬～8月上旬播きで、10月中下旬～11月上中旬収穫に適する。




オーナメントホワイ

コート 5000 粒 生種 2000 粒

11月～12月どり

- 品種特徴**
- 定植後約85日で収穫できる中早生種。
 - 葉枚数が多く、包葉性が非常に強い。
 - 草姿は立性で、草勢はややおとなしめ。収穫揃いは非常に良好。
 - 花蕾は純白で超緻密、重量感のあるドーム型。




ふくづき 福月

コート 5000 粒 生種 2500 粒

11月～12月どり

- 品種特徴**
- 草姿はやや立性で葉幅は広め。生育旺盛で栽培が容易。
 - 花蕾は純白で、緻密で良く締り、表面はなめらか。芯葉は花蕾をよく包皮する。
 - 収穫時の外葉の形状がよくまとまる。






木曽月

コート 5000 粒 生種 2500 粒

12月～1月どり

- 花蕾は盛り上がりがよく、硬く締り品質良好。
- 草姿は立性、外葉は濃緑色でやや厚く生育旺盛。
- 8月上中旬播きで11月下旬～12月収穫、8月下旬播きで1月収穫に適する。




輝月

コート 5000 粒 生種 2500 粒

12月～2月どり

- 草姿は立性、外葉濃緑色、芯葉は花蕾をよく包む。
- 花蕾は純白、盛り上がりよく、丸型で品質良く、硬く締り、ゆるみも遅い。
- 8月上中旬播きで、12月～2月中旬収穫に適する。




雪華

コート 5000 粒 生種 2500 粒

12月下旬～1月どり

- 葉が良く伸び、花蕾を包むため、日焼けの心配も少ない。
- 草姿は立性で生育は旺盛。
- 花蕾は堅く締まりが良いので、緩みにくい。




雪月

コート 5000 粒 生種 2500 粒



12月～3月どり

- 草姿は立性、丈夫で強く、栽培管理も容易。
- 花蕾はなめらかで白さも抜群、変色もしにくい。又、緻密で硬く締り重量感もあり、花蕾もゆるみにくく、収穫期の幅も広い。




F-085

コート 5000 粒 生種 20ml



3月どり

- 耐寒性でしっかりとした花蕾の晩生種。
- 外葉が硬く耐寒性に優れ、凍結や霜による傷みに強い。
- 花蕾の盛りと形状が良く、固く締り重みがある。




春月

コート 5000 粒 生種 20ml



2月～3月どり

- 耐寒性に優れ作りやすく、草丈はやや低い。
- 花蕾は白く、腰高丸型で締りが良く、毛羽立ちやリーフィーなど異常花蕾にもなりにくい。




おくづき 晩月 93

コート 5000 粒 生種 20ml



4月上旬～中旬どり

- 草姿はやや立性で強健、外葉は濃緑色で、耐寒性もあり栽培が容易。
- 花蕾は盛り上がりがよく、固く締り上質。異常花蕾の発生も少ない。






ともづき
知月

コート 5000 粒 生種 20ml



- 5 月どり
- 草姿は立性で外葉が良く伸び花蕾を覆いやすい。
 - 生育旺盛で栽培が容易。
 - 花蕾は白く、熟期の遅れがない。




せいげつ
清月

コート 5000 粒 生種 20ml



- 5 月どり
- 草姿はやや立性で、ねじれが強く幅広の葉で花蕾をしっかりと覆う。
 - 花蕾は厚みがあり純白。冬場の毛羽立ちが少なく品質に優れる。



カリフラワー作型表

収穫期	品 種 名	播種期
10 月～ 11 月	恋うさぎ、雪まつり、まり月	7/15 ～ 7/30
11 月～ 12 月	雪みね、オーナメントホワイト、福月	8/1 ～ 8/15
12 月～ 1 月	木曽月、輝月、雪華	8/10 ～ 8/15
1 月～ 2 月	輝月、雪月	8/10 ～ 8/20
2 月～ 3 月	雪月、春月	8/15 ～ 8/25
3 月～ 4 月	F-085、晩月93	8/25 ～ 8/30
春どり	知月、清月	11 月



ひのか
陽果

生種 1000 粒・100 粒



- 品種特徴
- 高温期においても生理障害果が少なく可販果収量が高い。
 - 草勢は中程度で、早生性に優れる。
 - 平均果重は220gで、果実揃いに優れる。

かれん

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒



- 品種特徴
- 萎凋病(F1、F2)、ToMV、半身萎凋病、葉かび病、斑点病に抵抗性で、ネマトーダに耐虫性、黄化葉巻病に耐病性の赤熟出荷向き大玉トマト。
 - 草勢は中程度、栽培後半までスタミナがある。
 - ※節間が詰まる品種なので栽培管理の省力化が望める。

ももたろう
桃太郎ホープ



黄化葉巻
耐病性品種

(品種名：TTM105)

生種 1000 粒



- 品種特徴
- 果形は腰高で秀品率が高い。
 - 低温伸長性に優れている。
 - 糖酸バランスが良く、食味良好。
 - 熟期は早生、早期多収となり、裂果にも比較的強い。

あい か
愛夏

(品種登録出願中：MST-1323)

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒・小袋



- 品種特徴
- 果実硬度が高く、耐裂果性に極めて優れている。
 - ToMV(Tm-2a)、黄化葉巻病、葉カビ病、萎凋病、斑点病、半身萎凋病、ネコブセンチュウに耐病性がある。
 - 果揃いが良く、平均1果重は220g前後。

れいしゅん

麗旬

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒



- 品種特徴
- 黄化葉巻病(イスラエル系、マイルド系両系統)に耐病性。
 - 草勢は中程度で、果実は果重220g～230g程度、形は豊円腰高で果色・色回りに優れテリがある。

ありさ

有彩 014

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒



- 品種特徴
- 高温期でも着果肥大が良く、収量性が高く、抑制栽培に最適。
 - 果重は220g程度で、果実は硬く日持ちが良い。
 - 黄化葉巻病(イスラエル系、マイルド系両系統)に耐病性。



TYプリマドンナ

黄化葉巻
耐病性品種

生種 500 粒



品種特徴

- 早生系で長期作における年内収量が多く、トータル可販果収量が多くなる。
- 果重は180g～200g程度。
- 果形の安定性が非常に高く、空洞果の発生も少ない。
- 草勢は中程度、シーズン通して裂果が少なく、春～初夏に問題になる黄変果にも強い。

桃太郎ピース

PVP 黄化葉巻
耐病性品種

(品種名：TTM076)

生種 1000 粒



品種特徴

- 甘みと酸味のバランスが良く、優れた食味を持つ。
- 220g程度の大玉で、裂果も少なく秀品率が高い。
- 短節間で栽培しやすく、葉先枯れの発生も少ない。
- 黄化葉巻病(イスラエル系、マイルド系両系統)に耐病性。

れいげつ 麗月

生種 1000 粒



品種特徴

- 極硬玉で裂果の発生が少なく、秀品率が高い。
- 着果性が良く、後半まで安定して果実の肥大がある。
- 水分要求量が高く、乾燥気味の水分管理では小玉傾向となりやすいため、やや多めの灌水管管理を心がける。
- 肉質良く、コクがあり食味は極めて良い。

れいき 麗妃

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒



品種特徴

- 着果性が良く肥大性に優れ、収量性が高い。
- 極硬玉で裂果に強く、早生で栽培の後半までスタミナがある。
- 萎凋病、根腐萎凋病、半身萎、ToMV、葉かび病、斑点病に抵抗性。ネマトーダ耐虫性、TYLCV 耐病性。

桃太郎ネクスト

生種 1000 粒



品種特徴

- 草勢が旺盛で花数が多く、着果性に優れる。
- 生理障害果(すじ腐れ果、軟果)の発生が少なく、食味も良好。
- 果形は腰高豊円で肥大力に優れ、果重は220～230g程度となる。

りんか 409

コート 1000 粒 生種 1000 粒・100 粒



品種特徴

- ToMV(Tm-2a)、萎凋病(F1、F2)半身萎凋病(V)、葉かび病(CL)、斑点病(LS)の抵抗性で、根こぶ線虫(N)に耐虫性を持つ。
- 草勢は初期にやや強く後半中程度で、果実は豊円腰高で色良く、硬玉で日持ち性がある。

ちか TY 千果

(品種名：TTM106)

PVP 黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒



品種特徴

- 果重15g～20gで、糖度は7度～9度で食味も良い。
- 千果と同様に果実は濃赤色で、果色はきれいな球形。
- 草勢は中程度で、やや早めに追肥を施し、草勢の低下に注意する。
- 葉かび、斑点病、根腐萎凋病に安定した耐病性を示す。
- 高温着果性が良い。

ちか サマー千果

生種 1000 粒



品種特徴

- 耐裂果性に優れ、ヘタどれも少ないため、出荷率が高い。
- 肥大性が良い。草勢は中程度で後半まで安定している。
- 節間短く作業性がよい。
- 葉かび病(Cf9)と斑点病に中程度の耐病性を示し、萎凋病レース1、ToMV(Tm-2a)に耐病性。

かちょうふうげつ TY 花鳥風月

黄化葉巻
耐病性品種

生種 500 粒



品種特徴

- 耐裂果は非常に強く、ガク落ち落果も少ない。
- 平均果重は15g～20gで果肉は硬め。
- 黄化葉巻病(イスラエル系、マイルド系両系統)、葉かび病、斑点病ともに耐病性。

ちか CF 千果

(品種名：TTM019)

PVP

コート 1000 粒

生種 1000 粒



品種特徴

- 葉かび病(Cf9)と斑点病に安定した耐病性を示し、ToMV(Tm-2a)、萎凋病レース1、サツマイモネコブセンチュウに耐病性。
- 花数は1果房あたり25花～35花程度、濃赤色でツヤがある。
- 果重15g～20gで、糖度は8度～10度の美味しい果実。
- 千果に近い生育特性を示し、強勢にするとめがねの発生や果形乱れを招くので注意が必要。



小鈴キング (MKS-T829)

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒

品種特徴

- 中葉で節間はやや短く誘引作業の手間が少ない。
- 花房は3～4段前後からダブル花房になり、着果性に優れる。
- 1花房あたりの花数は20～35程度、果重は18g～22g程度。
- 黄化葉巻病(イスラエル系、マイルド系両系統)、ToMV、萎凋病レース1、ネコブセンチュウ、斑点病に耐病性中程度。



恋味

黄化葉巻
耐病性品種

生種 500 粒

品種特徴

- 果皮・果肉とも柔らかめだが、裂果は少なく食感が良い。
- 果重は15g～18g程度の豊円形。
- 草勢は中程度で節間が非常に短く、誘引作業が容易。
- 初期からダブル花房がぎやうく花数が多い。



栽培ポイント

- 高温期定植は異常花房や異常主茎が発生するので9月以降に定植をする。

恋味 Amuse

黄化葉巻
耐病性品種

生種 500 粒



品種特徴

- 恋味よりも早生で初期収穫量が多く収量が上がる。
- 果実肥大が良く、耐裂果性に優れる。
- 葉かび病、黄化葉巻病(イスラエル、マイルド系両系統)、斑点病、萎凋病レース1、2、半身萎凋病、ToMV(2a)、ネコブセンチュウに抵抗/耐病性。

栽培ポイント

- 初期の草勢が強いと低段より果実が大きくなりすぎるので初期の窒素を抑え気味にする。

小鈴クイーン (MKS-T828)

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒

品種特徴

- 中葉で節間は短く誘引作業の手間が少ない。
- 花房は3段～4段前後からダブル花房になり、着果性に優れる。
- 1花房あたりの花数は25～30程度、果重は15g～20g程度。
- 黄化葉巻病(イスラエル系、マイルド系両系統)、ToMV、萎凋病レース1、葉かび病に耐病性強。ネコブセンチュウ、斑点病に耐病性中程度。



モモナ

単為結果
ミニトマト

生種 1000 粒

品種特徴

- 葉かび病(Cf4)、斑点病抵抗性。TMV(Tm-2a型)抵抗性。
- 小葉で節間は短く誘引作業が容易。
- 果房は3段目以降からダブル果房になる。低段は花数が少なく実が大きくなる。
- 糖度が高く、比較的裂果は少ない。
- ※単為結果とは受精しなくても果実ができ、受粉の必要がないため結実管理の省力化が可能。また、果実は通常種なしとなる。



プレミアムルビー

生種 1000 粒・100 粒



品種特徴

- 果色は鮮赤色で光沢があり、裂果が少ない。
- 果重は15～20g程度で揃いが良い。
- 斑点病、葉かび病、ToMV、半身萎凋病、サツマイモネコブセンチュウに複合耐病性を示す。

TYイエローミミ

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒

品種特徴

- 食味は甘みが強く極めて良好。
- 黄化葉巻病(イスラエル・マイルド両系統)耐病性、黄化えそ病、葉かび病、サツマイモネコブセンチュウにも安定した複合耐病虫性を有する。
- 草勢はおとなしく、節間がやや長めの草姿。



CF プチぷよⅡ

生種 1000 粒・100 粒・小袋

品種特徴

- 果皮が薄く、とろけるような食感で糖度が高い。
- 果実は強い光沢があり、果重は13～15g程度。
- 草勢はやや強く、果皮に弾力があり、裂果しない。



アイコ

コート 1000 粒・2000 粒

生種 1000 粒

品種特徴

- 萎凋病(F1, F2)、ToMV(Tm-2a)、葉かび病、斑点病に抵抗性のミニトマト。
- 草勢はおとなしく作りやすい。裂果の発生も少なく、上物率が高い。



イエロープリンス

ナカガミのタネ

生種 1000 粒・100 粒

品種特徴

- 草勢は中程度で栽培しやすい。
- 下段はシングル花房だが、上段につれてダブル花房となる。
- 果実は裂果が少なく、ガクも取れにくい。
- 糖度は8度～12度と高糖度。



甘くておいしい!

CF プチぷよイエロー

生種 1000 粒・100 粒・小袋

品種特徴

- 果皮が薄く、やわらかい食感で糖度が高く、酸味は少ない。
- 果実は光沢が強く、果皮に弾力があり裂果しない。
- 草勢は中程度で、節間は短い。



イエローアイコ

生種 1000 粒

品種特徴

- 根腐萎凋病(J3)に耐病性品種。
- 後半のスタミナ切れはなく樹勢は安定していて作りやすい品種。
- 花房は3葉毎に発生し果形は中甲高で秀品率は良い。
- 下段はシングル花房で、上段からダブル花房となる。



TYジュエルレッド

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒・小袋



品種特徴

- やや丸みを帯びたプラム型で吸肥力が高く、生育旺盛。
- 果重は16～18g程度のサイズで揃いが良い。
- 果皮はテリのある濃赤色で果肉は硬めで弾力があり肉厚。

TYジュエルイエロー

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒・小袋



品種特徴

- 吸肥力が高く、生育旺盛。1花房に20～25果着果する多収型。
- 果重は18～20g程度のサイズで揃いが良い。
- 果皮はテリのある黄色で果肉は硬めで弾力があり裂果が少ない。

ジュエルグリーン

生種 1000 粒・100 粒・小袋



品種特徴

- やや丸みを帯びたプラム型で草勢は強く低温伸張性がある。
- 果重は20～25g程度のサイズで揃いが良い。
- 果皮はテリのあるグリーンで果肉は硬めで弾力があり裂果が少ない。

TYジュエルオレンジ

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒・小袋



品種特徴

- 吸肥力が高く、生育旺盛。1花房に20～25果着果する多収型。
- 果重は18～20g程度のサイズで揃いが良い。
- 果皮はテリのあるオレンジで果肉は硬めで弾力があり裂果が少ない。

TYジュエルアイボリー

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒・小袋



品種特徴

- 吸肥力が高く、生育旺盛。1花房に20果以上着果する多収型。
- 果重は18～20g程度のサイズで揃いが良い。
- 果皮はテリのあるアイボリーで果肉は硬めで弾力があり裂果が少ない。

ジュエルトマト

生種 1000 粒・100 粒・小袋



品種特徴

- 草勢は強く節間は中位で草丈が高い。
- 果重は16～18g程度で光沢のある濃赤色で糖度9～10度。
- 果皮は薄く、肉厚でゼリーが少なく酸味も少ない。

TY レッドオーレ

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒



品種特徴

- 黄化葉巻病(イスラエル系、マイルド系両系統)耐病性、黄化えそ病、葉かび病、半身萎凋病、ToMV、サツマイモネコブセンチュウにも安定した複合耐病虫性を示す。
- 1花房あたり8果～12果程度着果し、平均果重は40g程度の中玉トマト。

TY ミディレッド

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒・小袋



品種特徴

- 吸肥力が高く、生育旺盛。1花房に8～10果着果する多収型。
- 果重は50g程度のやや大きめサイズで揃いが良い。
- 果皮はテリのある濃赤色で果肉は硬めで弾力があり裂果が少ない。

TY ミディイエロー

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒・小袋



品種特徴

- 吸肥力が高く、生育旺盛。1花房に10～12果着果する多収型。
- 果重は50g程度のやや大きめサイズで揃いが良い。
- 果皮はテリのある黄色で果肉は硬めで弾力があり裂果が少ない。

シンディースイート

生種 1000 粒



品種特徴

- 根腐萎凋病(J3)に耐病性品種。
- 後半のスタミナ切れはなく樹勢は安定していて作りやすい品種。
- 花房は3葉毎に発生し果形は中甲高で秀品率は良い。

TY ミディオレンジ

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒・小袋



品種特徴

- 吸肥力が高く、生育旺盛。1花房に10～12果着果する多収型。
- 果重は45g程度のサイズで揃いが良い。
- 果皮はテリのあるオレンジ色で果肉は粘質多汁で酸味は少なく食味が良い。

TY ミディアイボリー

黄化葉巻
耐病性品種

生種 1000 粒・100 粒・小袋



品種特徴

- 吸肥力が高く、生育旺盛。1花房に8～10果着果する多収型。
- 果重は50g程度のやや大きめサイズで揃いが良い。
- 果皮はテリのあるアイボリーで果肉は硬めで弾力があり酸味が少ない。



トマトの台木と耐病性

B：青枯病 K：褐色根腐病 J3：根腐萎凋病 V：半身萎凋病
F1：萎凋病レース1 F2：萎凋病レース2 F3：萎凋病レース3 N：ネマトーダ

	台木品種	ToMV 抵抗性	B	K	J3	V	F1	F2	F3	N	特性	草勢
	がんばる根	2a 型	8	3	○	△	○	△	×	○	青枯病強耐性	おとなしい
	がんばる根フォルテ	2a 型	9.5	3	○	○	○	○	○	○	萎凋病 F3 耐性	おとなしい
	がんばる根ベクト	2a 型	9	3	○	○	○	○	×	○	青枯病強耐性	おとなしい
	がんばる根トリバー	2a 型	8	5	○	○	○	○	○	○	強草勢長期栽培	やや強
	ブロック	2a 型	6	6	◎	◎	◎	◎	◎	○	萎凋病 F3 耐性	やや強
	マグネット	2a 型	6	5	◎	◎	◎	◎	×	○	青枯・根腐病耐性	強
	B バリア	2a 型	9	1	○	○	○	○	×	○	青枯病強耐性	おとなしい
	グリーンガード (登録品種名：GS-005)	2a 型	9	7	○	○	○	○	○	○	青枯・萎凋病 F3 耐性	中
	グリーンセーブ (登録品種名：TTM056)	2a 型	9	7	○	○	○	○	○	○	青枯・萎凋病 F3 耐性	中
	グリーンフォース (登録品種名：TTM081)	2a 型	8	7	○	○	○	○	○	○	青枯・萎凋病 F3 耐性	中
	キングバリア (登録品種名：TTM127)	2a 型	9.5	7	○	○	○	○	○	○	青枯病強耐性	強
	TTM-158	2a 型	8	7	○	○	○	○	○	◎	サツマイモネコブ センチュウ強耐性	強
	キャディ 1 号	2a 型	8	3	◎	×	◎	◎	×	○	青枯・萎凋病 F3 耐性	やや強
	根美 K	2a 型	8	3	○	○	○	○	×	○	褐色根腐病耐性	中
	根美 S	2a 型	8	6	○	○	○	○	×	○	青枯病強耐性	やや強
	フレンドシップ	2a 型	8	9	◎	◎	◎	◎	×	○	褐色根腐・青枯耐性	やや強
	アシスト ※かいよう病への優れた耐病性 を持っています！	2a 型	8	6	◎	◎	◎	◎	◎	○	かいよう病耐病性	やや強
	グランシールド	2a 型	10	9	○	○	○	○	○	○	青枯病強耐性 かいよう病耐病性	やや強
	TTM-079	2a 型	○	◎	○	○	○	○	○	○	強草勢	すごく強
	アーノルド	2a 型	×	○	◎	◎	◎	◎	×	○	強草勢	やや強

抵抗性：◎ 耐病性：○、△（弱）

●●●●●●●● ギアアップと Tecamin Max の合わせ技 ●●●●●●●●

ギアアップ

『窒素源の養分転換効率UP』

着花・着果・果実
肥大促進！
秀穂強化肥料。



+

Tecamin Max

『素速い窒素源(グルタミン酸)補給』

ストレス環境下での生
育をサポート！高濃度
アミノ酸含有肥料。



トマト苗シリーズ

プラグ苗

(72 穴・128 穴・200 穴・288 穴・406 穴)



ポットピンチ苗



プラグ子葉ピンチ苗



ロックウールキューブ



グローブロック



ナカガミ ココトップ苗

ココトップ



アース ストレート苗

直径が 5 cm で直接定植できる。

アース 50






結福 78

コート 5000 粒 生種 20ml

食味が良く、病気に強い年内どり品種

- 品種特徴**
- 播種後約 78 日程度で収穫可能な中早生種。
 - 軟腐病・べと病・黄化病・根こぶ病に強い。
 - 草姿は極立性で結束しやすい。外葉は濃緑色で尻張り・胴張りが良く、2.8kg～3.2kg で良く揃う。
 - 芯腐れ症・ゴマ症の発生は少なく在園性に優れる。
 - 球は青みの強い濃緑色で、球内色は濃い黄色で色あせが無く、市場性に優れる。




結福 85

コート 5000 粒 生種 20ml

石灰欠乏に極めて強い球肥大型中生種

- 品種特徴**
- 播種後 80～85 日で収穫できる中生黄芯種。
 - 根こぶ病に強く、石灰欠乏症、ゴマ症等に極めて安定した強さを持つ。
 - 球形は尻張り・胴張りのよい砲弾型で、3.2kg～3.6kg で良く揃う。

- 栽培ポイント**
- 花茎長の伸長がやや早いいため、収穫は 1 月上旬まで。




結福

コート 5000 粒 生種 20ml

耐寒性・在園性の良い年明けどり品種

- 品種特徴**
- 霜害・凍害に強く耐寒性の高い品種。
 - 軟腐病・べと病に極めて強く、根こぶ病に強い。
 - 草姿は極立性で結束しやすい。外葉は濃緑色で尻張り・胴張りが良く、2.8kg～3.2kg で良く揃う。
 - 芯腐れ症・ゴマ症の発生は少ない。
 - 球は極めて青みの強い濃緑色、球内色は濃鮮黄色で、食味がとても良い。




飛躍 (N-189)

コート 5000 粒 生種 20ml・10ml

在園性に優れ、根こぶ耐病性の晩生品種


- 品種特徴**
- 播種後 90 日で収穫できる黄芯系晩生品種。
 - 草姿は立性で、尻張り・胴張りの良い砲弾型。
 - 耐寒性が抜群で芯伸びが非常に遅いため、在園性に優れる。
 - 根こぶ病の他、石灰欠乏症などの生理障害にも強い。
 - 外葉の波打ちが少なく結束が容易。




スーパーCR黄味85

コート 5000 粒・100 粒 生種 20ml・1.2ml

- 品種特徴**
- 播種後約 85 日で収穫できる黄芯系品種。
 - 球形は砲弾型で、やや長めに仕上がる。
 - 根こぶ病に比較的強く、石灰欠乏症(芯腐れ症、縁腐れ症)にもなりにくい。
 - 内部は鮮やかな黄芯で、糖度が高く食味が良い。



ミニはくさい



コート 5000 粒 生種 20ml・10ml・小袋

- まいこ**
- 根こぶ病に強い黄芯系晩抽ミニ白菜。
 - 球高は 20cm 前後で、ミニ白菜としては耐寒性、晩抽性に優れており、裂球も遅い。
 - 一般種に比べ矮性に育ち、胴張り・尻張りに優れる。

コート 5000 粒 生種 2500 粒

- 娃々菜**
- 外から芯まで柔らかい 300g～500g のベビー白菜。
 - 播種後 60 日短期間で容易に栽培できる。
 - 密植栽培が可能で、面積あたりの収量が増える。

生種 20ml・小袋

- めだか**
- 晩抽性で耐暑性が高く、夏播き、秋播き、冬播きができる極早生種。
 - 播種後 50 日で 1～1.3kg になる。
 - 外葉はコンパクトで、ウイルス・軟腐病に強い。





ディープパープル



UC-201



ユニーク2号

晩抽ディープパープル (品種登録出願中 品種名: SHIRNE SKY)

コート 5000 粒

- 品種特徴**
- 非常に濃い赤紫色で、高温下でも発色が良い。
 - 耐暑性・晩抽性に優れ、高温下での栽培が容易。
 - 葉軸がしなやかで作業性が高い。
 - べと病および根腐病(レース1・2)に強い。

ディープパープル

コート 5000 粒

- 品種特徴**
- 非常に濃い赤紫色で、見栄えが非常に良い。
 - 下葉の傷みや軸折れが少なく、秀品率が高い。
 - 草姿は立性のため、収穫や包装作業などの作業性に優れる。
 - べと病と根腐病レース2だけでなく、一般病害にも強い。

ロゼフレイム (UC-201) (品種登録出願中 品種名: UC-201)

コート 5000 粒

- 品種特徴**
- 11月~12月にかけて収穫する品種。
 - 濃赤色の葉で高温期でも発色が良い。
 - 草姿はやや立性で、作業性が高い。
 - 葉柄は赤く染まりにくいいため、緑色とのコントラストがしやすい。

キュアレッド1号

コート 5000 粒

- 品種特徴**
- 晩抽性の早生種で、赤色は鮮やかな品種。
 - 草姿は開張性でボリュームが出る。
 - 高温下でも形状の乱れが少なく、葉柄の安定性が高い。
 - レタス根腐病レース1、2に比較的強い。

ユニーク2号

コート 5000 粒

- 品種特徴**
- 耐暑性に優れ、極晩抽性を持つ。
 - 葉色は色鮮やかな桃赤色であり、緑色とのバランスが良い。
 - 葉数が多く葉柄が大きいいため、加工にも適している。
 - チップバーン、さび病、根腐れ(レース1・2)に強い。



晩抽グリーンステージ



グリーンステージ



グリーンジャケット

リーフレタス

■ 10月~12月上旬出荷

晩抽ディープパープル、ディープパープル、UC-201、晩抽グリーンステージ、グリーンジャケット、ノーチップ

■ 12月上旬~1月下旬出荷

キュアレッド1号、ユニーク2号、レッドウェーブ、グリーンウェーブ、グリーンステージ

■ 1月上旬~3月下旬出荷

レッドウェーブ、グリーンウェーブ

晩抽グリーンステージ

コート 5000 粒

- 品種特徴**
- 晩抽性に優れ高温下でも栽培可能。
 - 葉がしなやかで収穫時の葉折れが少ない。
 - 根腐病レース1.2耐病性、べと病にも強い。

グリーンステージ

コート 5000 粒

- 品種特徴**
- 葉数が多く、ボリューム感のある品種。
 - 葉の弾力があり、立性のため収穫等の作業性に優れる。
 - べと病に強く、チップバーンにも比較的強い。

ノーチップ




コート 5000 粒

- 品種特徴**
- 生育は中生で抽苔は比較的に遅い品種。
 - 草姿は開張性でボリューム感がある。
 - チップバーンも発生しにくく、雨による葉傷みも少ない。

グリーンジャケット (PVP) (品種名: TLE460)

コート 5000 粒・120 粒

- 品種特徴**
- 晩抽性と耐暑性に優れ、高温期でも安定的に収穫が可能。
 - 高温期の多雨環境でも過剰な生育をせず、形状が安定する。
 - 肉厚でしなやかな葉質なので、葉折れしにくく出荷が容易。





オーウェン


(品種名：NOMUGI)



コート 5000 粒

10月～11月どり

- 根腐病レース1だけでなく、一般病害にも強く作りやすい。
- 形状安定性に優れ、秋どりに適する。
- 過湿による下葉の傷み、根傷みが少ない。
- チップバーンに強く、干ばつ条件での不結球の発生が少ない。
- 温度下降期にタケノコ球、霜害の発生が少ない。




ラブトル

コート 5000 粒

10月～11月どり

- サリナス系×エンパイヤー系の極早生品種。
- 球は大玉で、やや扁平。外葉は中～やや大きめで、外葉形成と結球肥大が同時進行するタイプ。
- 形状安定性が非常に高く、特にタケノコ球、らせん結球(スパイラル)、タコ足などの結球異常が非常に少ない。
- 斑点細菌病に強い。
- 極早生種だが、収穫適期は比較的広い。




ビルボード

コート 5000 粒

11月～12月どり

- べと病に耐病性。BV病にも比較的強いので、春どりでは初期感染による不結球が少ない。
- 灰色かび病や斑点細菌病などの一般病害にも比較的強い。
- 腰高球やタケノコ球の発生が少ないため秀品率が高い。
- 結球は早いけど過熟になりにくく、収穫適期が長い。




シルル

コート 5000 粒・100 粒

11月～12月どり

- サリナス系の早生種で晩抽性、耐暑性、耐病性に優れている。
- 温度感受性が鈍く、安定した結球性、包含性、尻張りを示す。
- 球形は豊円～やや扁平で、葉色は濃緑色でテリがある。




スプリンガー

コート 5000 粒

12月～1月上旬どり

- 結球性・形状安定性に優れる中早生品種。
- 玉の締りがゆっくりで、在圃性に優れる。
- べと病に強く、レタス根腐れ病(レース1)耐病性を示す。
- ピンクリブ、チップバーンに強い。




アスレ

コート 5000 粒

12月～1月どり

- サリナス系の中生種。
- 葉重型の結球を示し、球形は豊円形。
- 高温期を除くほとんどの作型に適応し、優れた特性を発揮する。
- 食味良好で美味しいレタスとして市場性が高い。
- 耐病性にも優れ、安心して栽培できる。



その他有望品種／
 マイヤー (品種名：ビードロス) 、フリフリッカー (品種名：SAKLET007)
 スターレイ (品種名：タララック) 、ホーガン、ワンダフル (品種名：KAY-006)



にんじん

にんじん

は種量 (10a) 生種 2dℓ × 5 缶・ペレット 1 万粒 × 10 缶


もえ 萌うさぎ

コート 1 万粒



吸込性の良い極晩抽性品種

- 播種後 100 日の早生タイプ。
- 裂根やシミ、軟病が少なく、歩留まりが良い。
- 根色は鮮やかな鮮紅で内部の肉色も濃い。




ベにほまれ ナカガミのタネ 紅譽 (NKK-025)

コート 1 万粒



晩抽性のある多収性品種

- 播種後 100 日～110 日の中早生タイプ。
- 草姿は半開張性で、草勢は中程度。
- 根長は 19cm～21cm 前後の円筒形。
- 黒葉枯れ病に強い。




YCC129

コート 1 万粒



晩抽性の中早生品種

- 極晩抽性で幅広い作型で栽培できる中早生品種。
- 根形は総太りの円筒形で収量性に優れる。
- 草姿は立性でコンパクトなため、機械収穫しやすい。




アロマ809・アロマ810

コート 1 万粒



- 播種から 115～120 日以降で収穫できる中生品種 (12 月末～2 月穫り向け) → 11 月中旬～12 月収穫向けは“アロマレッド”
- 茎葉の耐寒性が強く、年明け後も機械収穫が可能。
- 二次成長、二次発根が遅く、2 月下旬まで収穫可能。



アロマレッド


コート 1 万粒

生種 2dℓ・10mℓ



色・香りともに高品質のニンジン

- 播種後 110 日の中早生タイプ。
- 根長は 19cm 前後の円筒形。
- 濃紅色で尻詰まりが良い。
- 黒葉枯れ病、しみ症状に比較的強い。



エルザ

コート 1 万粒




濃鮮紅色で尻詰りが良い

- 播種後 110～120 日で根長 19～21cm。
- 草勢は強く立性。
- 密植栽培にも向き、加工用でも使える。
- 尻詰り良く、濃鮮紅色で芯色も濃い。



ゆうべに

コート 1 万粒




鮮やかな彩りの早生種

- 草姿は立性で初期より旺盛に生育し、地上部が強いので機械収穫に最適。
- 芯部まで非常に濃い紅色のため、加工用にも最適。
- 肩張り、尻詰まりの良い円筒形で収量性も優れる。




ベに紅はやて

コート 1 万粒



肥大力抜群！根色の良い早生品種

- 播種後 95～100 日で根長 17～18cm。
- 葉は濃緑で草勢強く立性。
- 尻詰り良く、肥大性に優れる。
- 吸肥力が良く、減肥栽培に向く。






株数 (10a)	8,500 ~ 10,000 株	は種量 (10a)	2dl × 2 ~ 4 缶
----------	------------------	-----------	---------------

夏巡り

コート 5000 粒 生種 2dl・20ml・5ml
11月～12月どり



- 品種特徴
- 草勢は弱～中のため、肥沃な条件が適する。
 - 軟腐病・横縞病になりにくく栽培が容易。
 - 播種後60日で根長36cm、根径7cm程度に揃う。




夏つかさ「快」

コート 5000 粒 生種 8000 粒・20ml
11月～12月どり



- 品種特徴
- 耐暑性があり、生理障害に強い。
 - 葉は立性で葉数が少なく、過繁茂になりにくい。
 - 根長35～37cm、根重1.3kg目安。




冬白慢

コート 5000 粒 生種 2dl・20ml・5ml
12月～1月どり



- 品種特徴
- 土質を選ばず、肥料に鈍感なため栽培が容易。
 - 小葉で立性、そろいが良いので密植栽培ができる。
 - 肌はなめらかでツヤがあり、ス入りが遅い。




夏の守

コート 5000 粒 生種 8000 粒・800 粒・小袋
11月～12月どり



- 品種特徴
- 耐暑性があり、肥大性にも優れる。
 - 葉は小葉で、立性でガッチリしている。
 - 根長36cm、根重1.2kg目安で、尻の詰りが良い。




秋こまち

生種 2dl・20ml・小袋
11月～12月どり



- 品種特徴
- 萎黄病、ウイルス病に強く、耐暑性に優れる。
 - 草姿は立性で密植栽培にも適する。
 - 根長38cm、根重1.2kg程度で揃いが良い。



英才

生種 2dl・20ml・小袋
12月～1月どり



- 品種特徴
- ス入りが遅く、肌が美しい食味の良い品種。
 - 葉が大きく耐寒性が良く、在圃性に優れる。
 - 根長38cm、根径7cm、根重1.2kg程度で揃う。




秋かなで

コート 5000 粒 生種 8000 粒・1000 粒
1月～2月どり



- 品種特徴
- 低温伸長性に優れ、根長37cm、根径7cmとなる。
 - 草姿はやや開張性で、密植栽培も可能。
 - 肌は純白で滑らか。ひげ根細く、揃いに優れる。




千都

コート 5000 粒 生種 2dl・20ml
1月～2月どり



- 品種特徴
- 寒さに強く、寒さによる首部の黄化や傷が少ない。
 - 尻の肉付きが良く、揃いが良いため秀品率が高い。
 - 適期栽培では根長38cm、根径8cm程度となる。




桜の砦

コート 5000 粒 生種 8000 粒・1000 粒・小袋
2月～3月どり



- 品種特徴
- 極晩抽性で低温伸長性に優れる。
 - 葉は濃緑の小葉で、立性でコンパクト。
 - 急激な肥大・伸長も無くゆっくり生育する。



冬侍

コート 5000 粒 生種 2dl・20ml
1月～2月どり



- 品種特徴
- 低温伸長性・肥大性が優れる。
 - 首色は薄青色となり、肌がきれいで外観に優れる。
 - 肉質は緻密でス入りは遅い。




春やよい2号

コート 5000 粒 生種 2dl・20ml・5ml
1月～2月どり



- 品種特徴
- 耐寒性が強く、抽苔・ス入りが遅い。
 - 葉は濃緑色の小葉でコンパクト、青首内部の青肉が少なく、肉質は緻密で、肌は純白で美しい。




春宴

コート 5000 粒 生種 8000 粒・800 粒
2月～3月どり



- 品種特徴
- 低温伸長性に優れ、露地越冬栽培に適する。
 - 冬播きでは青首色が薄めとなり、肉質は緻密でス入りが遅いため青果から加工まで利用可能。





株数 (10a) 7 万～12 万株 は種量 (10a) 2dℓ×3～5 袋

■ 春・秋播き品種

ひっせん
必閃

生種 1ℓ・2dℓ・20mℓ・小袋



品種特徴

- 草姿は極立性で葉絡みが少なく、収穫作業性に優れる。
- 根張りが良く、葉柄が太く、ボリュームがあるので収穫性に優れる。

適作型

- 3月～4月播種の露地栽培
- 9月～10月播種のハウス栽培

さと
里のなつ

生種 2dℓ・20mℓ・小袋



品種特徴

- 草姿は立性で、葉が絡みにくいため収穫作業性に優れる。
- 生育速度はやや早く、春・秋を含めて盛夏期も播種が可能。
- カップングやチップバーンの発生が少ない。

適作型

- 3月～10月播種の露地栽培
- 5月～8月播種のハウス栽培

さくらぎ

生種 2dℓ・20mℓ・小袋



品種特徴

- 耐寒性・晩抽性に優れた中早生品種。
- イオウ病・白さび病に耐病性がある。
- 草姿は立性で、照りが強く見栄えが良い。
- 下葉の落ちがよく、収穫作業性に優れ、軸もしっかりしているため収量性が高い。

適作型

- 3月～4月播種の露地栽培
- 10月～12月播種のハウス栽培

はる
春のセンバツ

生種 2dℓ・10mℓ



品種特徴

- 草姿は極立性で荷姿がきれい。
- 耐暑、耐寒性を持ち、乾燥に強く、栽培が容易。
- ボリュームがあるため加工用にも向く。

適作型

- 3月～9月播種の露地栽培。
- 3月～5月播種のハウス栽培。

■ 夏播き品種

まなつ よばんだしや
真夏の四番打者

生種 M 4 万粒・2000 粒



品種特徴

- 乾燥・酷暑環境に強く、最低限の灌水量で栽培できる。
- 生理障害(カップング、芯焼け、縁焼け等)が少ない。
- 葉が滑らかで重量がのり、株張り良く非常にバランスが良い。

適作型

- 5月～9月播種の露地栽培。
- 5月～9月播種のハウス栽培。

■ 冬播き品種

ふゆ ごうそっきゅう
冬の豪速球

生種 M 4 万粒



品種特徴

- 草姿は濃緑で美しく、極立性で作業性に優れる。
- 低温伸張性に優れており、厳寒期でも肥大性が良い。
- 暖かい時期に播くと収量性が下がるため、最低気温5度前後頃の作付けが望ましい。

適作型

- 10月下旬～12月播種の露地栽培
- 11月下旬～1月中旬播種のハウス栽培

なつ こうしえん
夏の甲子園

生種 1ℓ・2dℓ・10mℓ



品種特徴

- 環境変動に強く、徒長しにくく栽培が容易。
- 高温期でも一定の生育速度のため在圃性に優れる。
- 萎黄病耐病性、白さび病強耐病性を持つ。

適作型

- 5月～9月播種の露地栽培。
- 5月～9月播種のハウス栽培。

な
よかった菜 G

コート 5000 粒

生種 1ℓ・2dℓ・20mℓ



品種特徴

- 低温伸長性が良く、重量がのり、収量性が高い。
- 草姿は極立性で作業性が良く、見栄えも良い。
- 葉肉が厚いので萎れに強く店持ちが良い。

適作型

- 11月～3月中旬播種の露地栽培。
- 11月～2月播種のハウス栽培。

スタンフォース 20

ブライミング M 3 万粒

ベト病 R1 ～ 20 抵抗性



■播種日／ 10 月下旬～ 12 月

- 生育の早さは中程度で低温期にも生育はゆっくり伸び、厳寒期でも生育が止まりにくい。
- 葉枚数は多く葉肉が厚く、軸が太るので収量が上がる。
- 葉色は極濃緑色、葉姿は極立性で葉柄は折れにくく、収穫作業性に優れる。

スパイダーデューク

ブライミング M 3 万粒

ベト病 R1 ～ 19 抵抗性



■播種日／ 9 月中旬～ 2 月下旬

- 草姿は立性で、葉柄はしなやかで、収穫調整作業が容易。
- 低温による葉縮み、葉巻き、茎のパンク症状が出にくく、収量性が高い。

エアフォース 20

ブライミング M 3 万粒

ベト病 R1 ～ 20 抵抗性



■播種日／ 10 月下旬～ 12 月

- 低温伸張性が高い厳寒期作型向きの早生。
- 葉色は濃緑の葉重タイプで葉肉厚く、軸が太るので収量が上がる。
- 草姿は極立性で葉柄は折れにくく、収穫作業性は容易。

エクストリーム

ブライミング M 3 万粒

ベト病 R1 ～ 19 抵抗性



■播種日／ 9 月中旬～ 3 月上旬

- 秋～春播きの幅広い作型に適する中早生の生育で徒長しにくい。
- 草姿は超立性で葉柄はしなやかで作業性にも優れる。
- 葉は極濃緑色で光沢があり色ムラがでにくい。

ワイルドホープ

生種 M 3 万粒

ベト病 R1 ～ 15、17、19 抵抗性



■播種日／ 7 月～ 10 月上旬

- 草姿は立性で収穫作業性に優れる。
- 盛夏～初夏播き、春播きに適する。
- 高温期でも生育が旺盛で萎凋病に強いいため、夏の栽培でも安定した収穫が見込める。

ピンドン

生種 M 3 万粒

ベト病 R1 ～ 9、11 ～ 16 抵抗性



■播種日／ 10 月中旬～ 12 月上旬

- 葉は極立性で絡みが少ないので収穫作業性に優れる。
- 葉枚数が多く、株張りが良いので収量性が高い。
- 低温伸張性があるため厳寒期でも安定的に栽培できる。

ハイドン

生種 L 2 万粒・ M 3 万粒

ベト病 R1 ～ 11、13、15、16 抵抗性



■播種日／ 1 月～ 3 月下旬、 9 月中旬～ 10 月上旬

- 葉枚数が多く葉軸が太くなるため収量性が高い。
- 生育は中生で、在圃性が高く採り遅れが少ない。
- 立性で隣の株との絡みが少なく、収穫作業性に優れる。

徳兵衛

生種 L 3 万粒 M 3 万粒

ベト病 R1 ～ 15・17・19 抵抗性



■播種日／ 9 月下旬～ 3 月下旬

- 葉柄が太く株張りが良いため、収量性が高い。
- 葉柄はしなやかで折れにくく、収穫調整作業が容易。



株数 (10a) 4万～5万株 は種量 (10a) 2dℓ×3～5缶

やまひこ葱^{ねぎ}

生種 1ℓ・2dℓ・20mℓ

夏どり専用品種



品種特徴

- 暑さに強い極濃緑色葉ネギ。
- 一般的に葉ネギはハウスで周年栽培するが、高温の影響で夏場の生産が不安定になっている。
- 通常の施肥で葉色が濃く、高温乾燥による葉先枯れ、発芽不良等が発生しにくい、収量性に優れた夏どり専用品種。

すさまる

生種 1ℓ・2dℓ・20mℓ

夏どり専用品種



品種特徴

- 草姿は立性で葉色は濃く秀品性が高い。
- 高温期でも生育停滞しにくく、葉肉が厚く収量性が高い。
- 播種後60～70日で収穫できる中早生品種。

ブラックサマー

生種 1ℓ・2dℓ

夏どり専用品種



品種特徴

- 特に耐暑性が強く、4月～9月播きが最適。
- 葉は濃緑色の極立性で、倒伏にも強い。
- 折れにくく出荷作業が容易。
- 高温乾燥期でも葉先枯れや基部のふくらみが少ない。
- 荷姿・収量に優れ、食味・香りも良い。

ブラックキング

生種 1ℓ・2dℓ・20mℓ

夏どり専用品種



品種特徴

- 耐暑性に優れ、3月～8月播きが最適。
- 葉は極立性で、肉厚で濃黒緑色である。
- 折れにくく出荷作業が非常に容易。
- 葉柄部から基部にかけての締りが良く、収量性が高い。

ナカガミのタネ

レックス(NKW-229)

生種 1ℓ・2dℓ・小袋

春夏まき専用品種



品種特徴

- 耐暑性・耐寒性が強く、周年栽培が可能な品種。
- 葉は濃緑の肉厚で、葉先枯れの発生は少ない。
- 葉鞘基部の膨らみが少なく、作業性に優れる。
- 葉折れが少なく、輸送性に優れる。

ナカガミのタネ

スタンドアップ

生種 1ℓ・2dℓ

周年どり可能品種



品種特徴

- 耐暑・耐寒性を持った馬力のある周年栽培可能品種。
- 葉は極濃緑色の極立性で、葉折れ・葉先枯れが極めて少なく出荷作業が容易。
- 葉肉が厚く重量がとれ、病害にも強い。

ダークスリム 200

生種 1ℓ・2dℓ

春夏まき専用品種



品種特徴

- 揃いの良い葉ねぎ専用交配種で、2月上旬～10月中旬播きが最適。
- 生育は中早生で根張りが強いのが特徴。
- 葉は立性で葉折れが少なく、濃緑色で見栄えが良い。
- 葉先枯れは非常に少なく、根尻は球にならない。

パワースリム

生種 1ℓ・2dℓ

周年どり可能品種



品種特徴

- 3月～9月上旬播きが最適ではあるが、周年栽培可能な品種。
- 葉は細葉で緑色、葉質は硬く極立性で葉折れが少なく出荷作業が容易。
- 葉先枯れが非常に少なく、根尻が球になりにくい。



株数 (10a) 76万～95万株 は種量 (10a) 4ℓ～5ℓ

りゅうしょう
龍翔


コート 6000 粒

生種 2dℓ・20ml・小袋



品種特徴

- 悪天候でも欠株になりにくく、秀品率に優れる。
- 低温伸長性があり、葉数が多いため収量性が高い。
- 軟白部のきめが細かく、光沢があり見栄えが良い。



は にゅう いっ ぽん ふ と
羽生一本太


コート 5000 粒

生種 1dℓ・5ml



品種特徴

- 草姿は立性で葉は細めの濃緑色。
- 葉質が硬く、風雨による倒伏が少ない。
- 耐暑性があり、夏越しの栽培に特性を発揮する。



かん う いっ ぽん ふ と
関羽一本太


コート 5000 粒

生種 1dℓ・20ml



品種特徴

- 耐暑性が強く、夏越しに強い品種。
- 白根の太りはややゆっくりとした中生種。
- 草丈は中程度で葉伸びしにくく、葉折れが少ない。



こう う
頂羽


コート 5000 粒

生種 1dℓ



品種特徴

- 耐暑性のある早生系品種。
- 肥大力旺盛で重量感があり、収量性が高い。
- 葉色は濃緑で、草丈は中程度で葉折れが少ない。



た つ
龍のぼり


コート 6000 粒

生種 1dℓ



品種特徴

- 在圃性と肥大性に優れ、首締りが良い晩抽性品種。
- 葉色は濃緑色で、葉の病害に対して強い。
- 肌がきれいので首割れしにくい。



よう しゅん う た げ
陽春の宴


コート 5000 粒

生種 1dℓ



品種特徴

- 葉濃緑色で首部も丸く硬くなるので緩みがなく市場性が高い。
- 収穫後半でも首が良く締まって在圃性がある。
- 生育速度は中生～晩生



た つ
龍みのり


コート 6000 粒

生種 1dℓ



品種特徴

- 肥大性に優れ、秀品率の高い晩抽性品種。
- 葉色は濃緑色で早生肥大性が強い。
- 草姿はコンパクトで首締まりが非常に良く、首割れしにくい。



だ い ち ひ び
大地の響き


コート 5000 粒

生種 1dℓ



品種特徴

- 伸張性に優れ葉はやや長いが、ノロが少なく腐りが少ない。
- 草勢が強く、酷暑期の発根の衰えが少ないので、土壌病害や生理障害による株の抜け落ちが少ない。





夏双子



夏御前



ニイハオ・夏華



リューロン




セイロン

夏双子

コート 5000 粒 生種 2dl・20ml・小袋


- 品種特徴
- 葉は丸みのある長楕円形で色は濃い。葉柄の幅が広く厚みがあり、尻張りも良いので重量ものりやすい。
 - チップバーンに非常に強く、白さび病にも強い。



夏御前

コート 5000 粒 生種 2dl・20ml

- 品種特徴
- 尻張り、締りが良く、非常にボリューム感がある。
 - 葉先までピンと立つため、出荷調整作業が容易である。
 - 根こぶ病に対して抵抗性を備えている。




ニイハオ夏華



生種 5万粒


- 品種特徴
- 耐暑性に優れ、チップバーンや節間伸長などの高温障害の発生が少ない。
 - 葉色が濃く、肉厚で重量が出る。



リューロン

コート 5000 粒 生種 5万粒・5000 粒・小袋


- 品種特徴
- 草姿は立性で葉色は濃緑色。
 - 抽苔は遅く、低温伸長性がある。
 - 根こぶ病抵抗性があり、発生地でも栽培可能。



セイロン

コート 5000 粒 生種 5万粒・5000 粒・小袋

- 品種特徴
- 草姿は立性で葉色・葉柄色は鮮緑色。
 - 葉数型で形が崩れにくく、在圃性に優れる。
 - チップバーンやカッピング等の生理障害に強い。



ニーナ

生種 350 粒

- 品種特徴
- うどんこ病・褐斑病・べと病に強く栽培が容易。
 - 果実は21cm~22cmで形状が安定している。
 - 周年で栽培が可能。


- 適作型
- ハウス全般(促成・半促成・雨除け・抑制・越冬)



瑞帆

生種 350 粒


- 品種特徴
- 複合耐病性(うどんこ病・褐斑病・べと病)で、初期から果実肥大が早く、後半までスタミナ抜群。
 - 果形が安定し色つや良く、箱詰めしやすい。
 - 果実は21cm~22cm。



プレスト

生種 100 粒・350 粒

- 品種特徴
- うどんこ病・褐斑病・べと病の複合耐病性で、後半までスタミナがある。
 - 果実は21cm~22cmで、収穫初期から果形が安定する。



ニーナ Z

生種 350 粒

- 品種特徴
- うどんこ病・褐斑病・べと病に強く栽培が容易。
 - 果実は21cm~22cmで形状が安定している。
 - 「ニーナ」に比べ分枝性が良く、草勢を強く維持できる。
 - 周年で栽培が可能。

- 適作型
- ハウス全般(促成・半促成・雨除け・抑制・越冬)




あすとろ

(品種名: KUC1902)

生種 100 粒・350 粒


- 品種特徴
- うどんこ病・褐斑病・べと病の複合耐病性に加え、キュウリ黄化えそ病に耐病性がある。
 - 果実は20cm~21cmで、高温期でも果実の乱れも少なく安定している。



なるなる ZUTTO

生種 350 粒

- 品種特徴
- うどんこ病・べと病・ウイルス(ZYMV)病に耐病性。
 - 果実は平均21~22cmで歯切れよく、食味も良好。
 - 作型は露地~ハウスまで幅広く適する。
 - 側枝の発生が多いタイプで、長期間の栽培に向く。





は種量 (10a) 4 ~ 5 ㍓


ニムラサラダスナップ

(品種名：ニムラサラダ1号)

生種 1 ㍓・1d㍓・20m㍓

莢ごと食べる濃緑実えんどう


- 着莢節位の低い極早生種で2~3本分枝して収穫期間の長い豊産種。
- 露地栽培~ハウス栽培まで幅広く使える。



美笹

生種 1 ㍓・1d㍓・20m㍓


- 播種後約50日で収穫始めとなる超極早生品種。
- 着莢性がよく、初期収穫も優良品が多く長期安定した収穫が出来る。
- 双莢性が強く長さ5~6cm 幅1.4~1.6cm、2g程度の形状で揃いが良い。



白星

生種 1 ㍓・1d㍓・20m㍓

- 草丈が低く、地際に近い節位から着莢する極早生種。
- 通常1花房に2莢ずつ着き、条件が良くなると1花房に3莢着く事もある豊産種。
- 絹さやえんどうより数日遅らせ、豆を少し膨らませた時が収穫適期。



おすすめ資材!

アグリレーション スペシャル 324



3kg(投下量)／灌注1回
▷ 103 ページ参照

天然フルボ酸(液)



1000倍を葉面散布
▷ 102 ページ参照

メイクアップ



1000倍を葉面散布
▷ 98 ページ参照

アリオン

(品種名：KA-956)

PVP

コート 5000 粒

生種 1d㍓・20m㍓

プレミアムな超極早生品種

- 収穫期は3月上旬~下旬の超極早生種。
- 根量が多く、抽苔・分球が少なく収量性に優れる。
- 球の形状は甲高で良く揃う。



スプリングスター

コート 1 万粒

生種 100g・10g

揃いが抜群な極早生品種

- 収穫期は4月中旬~下旬の極早生種。
- 球形は丸形で、玉重は300g程度でよく揃う。
- 鱗片は厚く多汁質で甘味があり、生食に向く。



涼

コート 5000 粒

生種 2d㍓・10m㍓

色良く肥大力にすぐれた中早生品種

- 収穫期は5月中旬~下旬の中早生種。
- 球の形状は甲高形で、きれいな黄銅色。
- 倒伏直前まで立性で作業性が良い。
- 大玉だが8月末まで貯蔵が可能。



浜笑

(品種名：浜笑)

PVP

コート 5000 粒

生種 2d㍓・20m㍓

多収の超極早生品種

- 収穫期は3月中下旬の超極早生種。
- 草姿はやや立性、短葉でコンパクトながら生育は旺盛。
- 球の形状は甲高形。




錦毬

コート 5000 粒

生種 2d㍓・20m㍓

5月収穫の早生品種

- 収穫期は4月中下旬~5月上旬の早生種。
- 丸玉で揃いが良く、生育旺盛。
- 玉重は300g程度になる多収品種。



慶

コート 5000 粒

生種 2d㍓・10m㍓

抜群の貯蔵性

- 播種期は10月上旬~下旬まきで、収穫期は6月上旬~中旬の中生種。
- 分球が少なく、年明けまで貯蔵が可能。
- 赤銅色の甲高形状で揃いが良い。



玉
ね
ぎ




早生子宝

生種 1500 粒、100 粒

品種特徴

- 耐暑性、耐寒性に強く、生育旺盛で栽培容易。
- 球の形状が良く、揃いが良い。
- 定植後 90 日前後で収穫可能な早生品種。




ベビースター

生種 1500 粒、100 粒

品種特徴

- 耐暑性が強く、強勢で作りやすい。
- 定植後 100 日前後で収穫可能な早生品種。
- 低温結球性に優れ、収穫作業性も良い。




カヴォレッティ

コート 1000 粒

生種 200 粒、小袋

品種特徴

- 結球性が強く大玉に揃い集品率が高い。
- 節間が伸び収穫しやすい。
- 歩留まりが良く、抽苔が遅いので3月まで出荷可能。




カーボネロ・フォルツァ

コート 1000 粒

生種 200 粒

品種特徴

- 形状、揃い、伸張性、収量性が優れる。
- 病気に強く栽培しやすい。
- 黒葉の濃緑色で形状は菱形に近い。




カリノケールヴェルデ

コート 5000 粒、1000 粒

生種 200 粒、40 粒

品種特徴

- 春秋兼用品種。
- 波状になり葉は縦に伸びやすい。
- 低温になると縮みが強くなる。




カールドモンロー PVP

コート 5000 粒、1800 粒

生種 2000 粒、200 粒

品種特徴

- 縮みが緩やかで葉質がやわらかいカールドタイプ。
- 葉は波状に湾曲し細い縮みがある。
- 生育旺盛で栽培しやすい。





小カブ


白馬

品種特徴

- 周年栽培できる小カブ。
- 肉質は軟らかく、食味が良い。
- 浅漬けなどの漬物にも最適。

コート 5000 粒

生種 2dℓ・1dℓ・20mℓ・小袋




ニュー白根

品種特徴

- 根こぶ病、萎黄病に強い春～秋播き品種。
- 高温下でもス入りが遅い。

生種 1dℓ・4mℓ



中カブ


ゆきわらし

品種特徴

- 白さび病に強い。
- 低温肥大性が良く、作業性も優れる。
- 変形や尖り球になりにくい。
- 肉質は軟らかで、甘みが強い。

コート 5000 粒

生種 1dℓ・20mℓ・小袋




CR 味くらべ

品種特徴

- 根こぶ病抵抗性品種。
- 揃い良く、早太りで小～中カブまで随時収穫できる。
- 肉質は柔らかく甘みがある。

生種 2dℓ・20mℓ・小袋




桃カブ

品種特徴

- 根こぶ病に強い。
- 肉質が柔らかく甘みがあり、サラダなどの生食に使える中赤カブ。

コート 5000 粒

生種 1dℓ・20mℓ・4mℓ




大カブ

CR 大政

品種特徴

- 根こぶ病に強く、栽培容易なカブ。
- 球揃いが抜群に良い。
- ス入りは遅く、裂球・変形は少ない。

生種 1dℓ・20mℓ・小袋




CR 味太鼓

品種特徴

- 根こぶ病抵抗性品種で、各種病害に強く栽培が容易。
- 播種後 75 日で 1kg 前後、最大 2kg まで太る。
- ス入りは遅く、裂球変形少なく、千枚漬け等の加工に向く。

生種 2dℓ・20mℓ・小袋



ベビーリーフ

単品：生種 1ℓ・1dℓ

ミックス：生種 1ℓ・20mℓ



赤と緑と黄の小さな野菜

Baby Leaf

ベビーリーフ

レタスミックス

10 種類のアブラナ科葉物野菜のミックス種子。赤、緑、黄色系の混合で、葉形は変化に富む。

葉っぱミックス

8 種類のリーフレタス+エンダイブ+ビートのミックス種子。赤、緑、黄色系の混合で、葉形は変化に富む。



その他品種

レッドロメイン (夏用)、グリーンオーク (濃緑)、レッドオーク (夏用)、レッドサラダ (夏用)、ロロロッサ (夏用)、エンダイブ、ルッコラ (セルバティカ)、晩生ミズナ、F1 黒葉ピノグリーン、切葉レッドマスタード (真紅)、ブラックケール、縮種グリーンケール、F1 レッドバクチョイ、レッドアマランサス (緋赤)、F1 グリーンスピナッチ (サボイ) など






パパイヤ

品種特徴

青パパイヤとは…青パパイヤ（野菜パパイヤ）はフルーツパパイヤの未熟果で、東南アジアや沖縄県では日常的に食べられている野菜。

- 5月中旬頃の定植で、9月下旬～12月上旬収穫。
- 防寒対策は夜温が10℃を上回るまで継続する。
- たんぱく質を分解する「パパイン」をはじめとした各種分解酵素を豊富に含み、ダイエット食品として機能が評価されている。ポリフェノールやビタミンCも多く含むため、抗酸化作用が期待できる。

品種	果重	特徴
煌月	1.5～2kg	低段から生る早生品種。
天煌	1.5～2kg	生育旺盛で、結実性に優れた矮性品種。
ベジキング	1.7～2.5kg	実が大型で多収量が見込める。
グランデ	1.7～2.5kg	野菜用パパイヤに最適な品種。
フルーツタワー	1.7～2.5kg	糖度が高くフルーツ用に最適。




パッションフルーツ

品種特徴

- トケイソウ科トケイソウ属の蔓性多年草。
- 果実は種を包む半透明の仮種皮がゼリー状で甘酸っぱい。

品種	特徴
サニーシャイン	果皮は紫色で甘みと香りが強い品種。果重110gとやや大果で、高温期の着色不良果が少ない。
パープル	果皮は紫色で、食味の良い品種。



アボカド

品種特徴

- 「森のバター」と呼ばれ、最も栄養価の高い果物としてギネスブックに認定されているトロピカルフルーツ。
- 開花時期は3月～5月上旬。
- 開花タイプはAタイプ・Bタイプの2種類があり、一緒に植えることで着果が安定する。

耐寒温度	品種	開花タイプ	果重	特徴
－6℃	メキシコーラ	A	100g	ベーコン等の受粉樹に
－4℃	ベーコン	B	300g	果肉はなめらかで甘みを感じる
	フェルテ	B	300～400g	油分が多く果肉なめらか
－2℃	ピンカートン	A	300～500g	食味は濃厚で着果が良い
	ハス	A	200～300g	収量が多い
	ワーツ	A	300～500g	樹が半矮性で大きくなりにくい
－1℃	リード	A	400～600g	食味・着果良好
	サンミゲル	B	300～400g	着果よくクリーミー
－1℃～0℃	マラマ	B	500～700g	果肉なめらかでナッツの香り
0℃	チョコテ	A	600～1000g	超大玉で豊産種
	モンロー	B	500～900g	大玉で着果が良い
	ミゲル	B	600～700g	大玉で着果が良い



マンゴー

品種特徴

- アーウィン 果皮は鮮やかな赤色で果色はオレンジ色。
- 甘味が強く、適度な酸味も含んでいて濃厚な味わい。
- キーツ 重さは500g～2kgになる。完熟しても赤くならないが糖度は16度～19度と高く幻のマンゴーとされる。



- キンシン 形は長楕円で色は赤色をしている。果実の平均は約1350gと大玉となる。
- マヤ 果皮、果肉ともに橙黄色で丸型の果実。
- アンジー 果実は400g前後となり樹は半矮性で着果が良い。

ライチ

品種特徴

- 玉苧苞 果実直径3cm前後で、糖度は15度、種は小さい。
- 皮のトゲが特徴のグリーンライチで、熟しても果皮は緑色。別名ドラゴンライチとも呼ばれ、希少な高級品種。



- ノーマイチ糯米 果実は2.5cm～3cmで糖度が高く、果汁たっぷりのモチモチとした食感。
- 種が小さく果肉の割合が多いため食べ応えがある。
- 1本で結実する品種。

チェリモヤ

品種特徴

- フェノ・デ・フェテ 果実重量250g前後。
- ビッグシスター 果皮のウロコ模様の中央部に小さい突起があり、ややデコボコしている。大果系品種で、果重は600g前後となる。



- ピアス 開花期間が長く、収穫時期も長い。
- 果実の大きさは中くらいの卵型。甘味が強く糖度は29度に達するものがある。

アテモヤ

品種特徴

- 果重600g～1000gと大玉で、甘みと程よい酸味、強い芳香を兼ね備えた近年人気のフルーツ。
- チェリモヤを品種改良して作られ、高温に強い。
- 別名「森のアイスクリーム」「カスタードアップル」とも。



産直販売おすすめ品種

■ 12月から青切り出荷が可能な超極早生

アリオン **PVP**


(品種名: KA-956)

ペレット 5000粒

生種 1dL・20mL



- 品種特徴**
- 驚異の早生性！玉肥大良好。
 - 抽苔・分球等の発生が少なく、収量性に優れる。
 - 甲高によく揃い、食味も良く繊維質も少ない。




■ 食味が良く抑制栽培できる品種

なつみかん 夏まき味甘ちゃん

生種 2000粒・200粒



- 品種特徴**
- 初夏～盛夏播き、秋収穫の抑制栽培。
 - 粒は濃い黄色で甘味が強くジューシー。
 - 生育日数87～88日で、栽培しやすい。
 - 長めの穂長で、穂重400～450g。




■ 着果数が多いミニカボチャ！

パンプキッズ

生種 500粒・100粒・小袋



- 品種特徴**
- 高品質な貯蔵用。
 - 果実は2kg前後。
 - 粉質感と甘みのバランスの良いカボチャ。
 - 開花後約55～60日で収穫。




■ 味がよい耐病性の節成胡瓜

なるなる

生種 350粒・小袋



- 品種特徴**
- 60日、75日、90日タイプのラインナップ
 - 花蕾は、2kg以上にもなり、ボリュームがある。
 - 味にクセがなく、最大の特徴は、茎の甘く柔らかい食味。




産直販売おすすめ品種

わわさい 娃々菜

生種 2000粒・200粒

- 品種特徴**
- 外葉から芯まで柔らかく甘味がある品種。
 - 300g～500gの大きさと使い切りができる丁度良いサイズ。
 - 鍋物や炒め物意外に生のままサラダでもおいしい。




あじだいこん YR 味づくり おでん大根

コート 5000粒

生種 2dL・20mL・小袋


- 品種特徴**
- 早太りでおでん用途に向く青首総太り大根。
 - Y R (萎黄病抵抗性)を持ち、ウイルス病等にも強い。
 - 出荷用フィルム使用で、売り場で目を引く！



スティックシュンギク

生種 1L・1dL・小袋


- 品種特徴**
- 葉が上部に集中し「椰子の木」の草姿となる。
 - 葉は小型でキザミは細かい。廃炉は明るい緑色。
 - 軟らかく、香りもマイルドなので食味良く、生食可能。



ひろせな 広瀬ちぢみ菜

生種 1dL・20mL・小袋

- 品種特徴**
- 葉がちりめん状に縮む葉菜です。
 - 葉は円形・肉厚で濃黒緑色です。
 - 耐寒性・耐暑性が強く、周年栽培可能です。
 - おひたしや炒め物に好適です。



元肥ロング型肥料 ベストマッチシリーズ 好評


20kg入 元肥：10a 当たり 6～8 袋

商品特性 葉菜用 288 (22 - 8 - 8)

葉菜類に最適な肥効が穏やかに長時間持続

- 生育初期に効く化成肥料と、生育初期・中～後期に効く2種類の被覆肥料を配合。
- 窒素・リン酸・カリの他に苦土も配合しており、高成分だがじっくりと効くため生育が安定する。
- キャベツ、レタス、ブロッコリーなどの葉菜類の他、スイートコーン、かぼちゃ、ズッキーニにも好適。

ベストマッチ葉菜用288の肥効イメージ




商品特性 低温溶出 267 (22-6-7-Mg1-B 0.05)

低温時でも溶出が早く初夏作向けに最適

- 低温期に定植する葉菜類の生育に適するよう、初期に効く化成肥料と、外葉生育期・結球開始期・収穫期のそれぞれに効く3種類の被覆肥料を配合。
- 窒素・リン酸・カリのほかに、苦土・ホウ素成分も含有し、高成分かつじっくりと効くため生育が安定する。

ベストマッチ洋菜267の肥効イメージ



ナカガミのタネ 葉菜用 イッパツ肥料 NEW

20kg入 元肥：10a あたり 4～6 袋

23-6-10 Mg5 約80日タイプ

窒素全量	リン酸	カリ	苦土
23.0	6.0	10.0	5.0

葉菜に適した肥効バランスで安定生育！

- 特徴
- 近年の高温に合わせた最適設定の肥効で設計してある。
 - 初期生育を順調にさせるための即効性窒素を50%含み、その後数種類の被覆肥料で無駄のない肥効を保つ。
 - 露地栽培での降雨などによる肥料成分の早期流亡の対策にもなる。
 - 栽培中の肥料成分の利用効果が高い為、肥料コスト低減が期待できる。
 - 固結しにくい成分を使用している為、作業効率も向上する。
 - 苦土・マンガン・ホウ素を含み光合成を強化し、生育を助け病害抵抗性を高める。また、欠乏症対策にも期待ができる。
 - 長期作には追肥が必要になるので、作物の生育状況をみて、生育中・後期に成分不足が見られた場合には追肥を施肥する。



ナカガミのタネ キックベース

20kg入 元肥：10a あたり 4～8 袋

18-7-15 Mg1 約100日タイプ

窒素全量	リン酸	カリ	苦土
18.0	7.0	15.0	1.0

4種の肥効で安定生育！

- 特徴
- 初期の肥料と3パターンの溶出の被覆肥料を配合してある為、安定的に肥料を供給することができるので安心して使用できる。
 - 長期的な肥効をもつ為、肥料成分を無駄なく吸収する事ができ、丈夫で揃いの良い作物作りに役立つ。
 - 肥効が長期持続するので追肥の手間をはぶき労力の低減に役立つ。
 - 無駄のない肥料効果を供給できる為、環境に配慮した栽培が可能になる。
 - カリ成分を高めているので、根張りを良くし、環境ストレスへの抵抗性も高める。また細胞強化の役割もあり、耐病性や高温対策にも期待できる。



キックベース使用の菊栽培圃場▶

ベースアップジー BASE UP-G



好評

20kg入 10a 当たり 1袋

植物の生長能力を引き出す！

「フルボ酸」という高分子・炭水化物の安定供給により、作物の生育に必要なエネルギーをチャージさせ（ブースター & バッテリー効果）低温・高温などのストレス下での生育停滞を緩和できます。
「フルボ酸」と「グルタミン酸」等の相乗効果により、様々な作物を安定増収へと導きます。

保証成分	窒素全量	水溶性加里	
	7.5	4.0	
含有成分	フルボ酸	フミン酸	遊離アミノ酸
	20.5	8.5	9.5

商品特性

- フルボ酸はpHに関係なく溶解し、作物の根から直接吸収されて、速効的に光合成量を増やす効果と発根促進作用（植物ホルモン類似効果）が期待できる。
- 作物に対する炭素、窒素、ミネラルなどの養分補給能力を向上させ、より健全な生育が得られる。
- 遊離アミノ酸「グルタミン酸」が豊富に含まれており、曇天時に光合成が阻害されても、グルタミン酸を補充することで、植物体内のタンパク質合成が進行し、生育不良を改善する効果が得られる。
- 肥効は土壌混和/1ヵ月、表層施肥/2ヵ月

【使用上の注意】

- 強いアルカリ性の土壌改良資材及び農薬とは混用散布しないでください。
- 植物の上に乗ると葉焼けを起こす場合があります。十分注意してください。

フミン酸とフルボ酸の特性比較

	フミン酸(腐植酸)	フルボ酸
水への溶解性	酸性水には不溶	pHに関係なく溶解
土壌中の溶解性	移動しにくい	移動しやすい
植物への効果	土壌を介した間接的効果	植物への直接的な効果(発根促進等)
主な作用	土壌の物理的改良 保肥力の改善 土壌のリン酸吸収率軽減 土壌微生物の活性化	光合成能の増強 根の伸長及び発根形成の促進 ミネラルのキレート作用による吸収増加 根の生理的活性の増大

玉ねぎ苗での施用比較



無施用区に比べ葉数・根量が増し、生育の向上が見られる。

菊での施用比較



葉枚数が3～5枚程度増加し、節間はそのままに無施用区より10cm程度草丈の伸びが良い。ハウス内の悪条件下でも、好条件下と同等の生育が得られた。




BASE UP-G

愛知県田原市 輪菊栽培にて生育前進による回転数の向上


試験地	品種	定植日	測灯
田原市	精興の誠	10/16	12/19
試験商品	施用日	施用量(10a)	
BASE UP-G	①11/6(定植21日後) ②12/28(定植73日後)	①19.5kg ②19.5kg	
散布方法 畝間施用(ベト間)(毎畝間ではなく2畝間中1畝間に施用) ※対照区にのみ有機質肥料(5-4-2)を180kg/10a施用			

茎径(mm)と生葉数(枚)の比較

	茎径(mm)	生葉数(枚)
対照区	7.75	44.3
BASE UP-G区	8.90	49.5
対比(BG/対)	115	112





2/9収穫時調査



平均草丈97cm

平均草丈108cm



BASE UP-G の施用で製品収量が大きく増収(茎径、葉数増)

◎農家さんの感想：初期生育から明らかに葉数多く茎太く、丈が大きかった。丈は92cmに調整して出荷、92cmに達する期間が短くなるとその分年間の作付回転数が増えるメリットあり(3回転/年⇒3.7回転/年)

BASE UP-G


大葉(しそ)の生育促進・収量大幅アップ

○使用結果

・6月から12月までのトータル量比較



・6月から12月までの出荷量推移



○使用方法

試験地		品目	
愛知県豊川市		大葉(しそ)	
試験商品	施用時期	施用量 (10a)	
BASE UP-G	定植後すぐ	20kg	
散布方法			
通路に表層散布			



通路部分表層にBASE UP-Gを手散布20kg/10a



20kg/10a

●まとめ

BASE UP-G の施用後の6月から12月までの出荷量を比較すると、前年と比較し出荷量が大幅に向上しトータルで過去最高の出荷量となった。特に2023年シーズンは、水害や夏場の高温で地域で出荷量を落としている状況であり、生育不良環境下におけるBASE UP-Gの施用効果がハッキリとみられた。

ナカガミのタネ

ディー シー ビー こう ど か せい

DCP 高度化成 480

20kg入 元肥：10a あたり 4～5 袋
追肥：10a あたり 2～3 袋

骨リン酸を使用した溶出の良い元肥・追肥兼用化成！

商品特性

窒素全量	リン酸	カリ	苦土	ホウ素
14.0	8.0	10.0	2.0	0.10

- リン酸の半量は「DCP（第二リン酸カルシウム）＝骨リン酸」で、土中の薄い酸にも良く溶け、栽培初期～後期までしっかりと肥効が続く。
- 土中に無駄な成分が蓄積されにくく、従来の化学肥料のみの高度化成よりも機能性が高い。



ナカガミのタネ

さく はたけ エヌ こう

ホウ作畑 N14号

20kg入 追肥：10a あたり 2～3 袋

窒素とミネラルを同時に補給できる追肥化成！

商品特性

窒素	苦土	マンガン	ホウ素
14.0	3.5	0.10	0.25

- 土壌改良材の「ホウ作畑」と窒素肥料を配合し、追肥として窒素、ミネラルの同時施肥が可能なミネラル強化・野菜の追肥専用肥料。
- 水溶性のミネラルのため、吸収され易く、根張り、生育が良くなる。
- 生育不良時の改善に役立つ。



カルシニット

20kg入 追肥：10a あたり 2 袋

硝酸性窒素 14.7%・水溶性カルシウム 26.3%を含有！

商品特性

硝酸性窒素
14.7

- 硝酸態窒素と水溶性カルシウムを主体とした肥料。
- 低温・早魃・極度の酸性及びアルカリ性土壌でも影響がなく、作物に速やかに吸収される。
- カルシウム欠乏による生理障害を防ぐと共に、土壌深層部までよく浸透する。



ナカガミのタネ

つい ひ か せい

コラーゲン入り追肥化成

20kg入 葉菜類追肥：10a あたり 2～3 袋

汎用性の高い、追肥専用V型有機化成肥料！

商品特性

窒素全量	リン酸	カリ
15.0	5.0	15.0

- 有機態窒素の原料はコラーゲンと尿素、硫酸、リン酸で、リン酸原料は「リン酸二アンモニウム」、カリは「塩化カリ」と「硫酸カリ」を使用。
- コラーゲンの50%は野菜の旨みやコクに関係する「プロリン」「グルタミン」「グリシン」で構成されている。



ワンダッシュ

20kg入 追肥：10a あたり 2～3 袋

速攻性と持続性を抜群に兼ね備えた機能性肥料！

商品特性

窒素全量	リン酸	カリ
18.5	4.0	9.0

- 窒素は硝酸性窒素とアンモニア性窒素で構成され、速効性と持続性を兼ね備えるため施肥の省力化が期待できる。
- 低温時にも高い吸収効果が期待できる。
- 腐植酸含有により保肥力向上。
- 高窒素で追い込み時の追肥に適している。



プロベスト 8号

20kg入 果菜元肥：10a あたり 6～8 袋
追肥：10a あたり 2～3 袋

コラーゲンと骨リン酸入り高級有機化成！

商品特性

窒素全量	リン酸	カリ	苦土
8.0	18.0	10.0	2.0

- 活性の強い動物性有機コラーゲンを使用し、土壌中の有用微生物の繁殖を活発にする。
- リン酸は土壌固着されにくいため、作物の生育を高める。
- 硫酸カリを使用することでリン酸の吸収を促し、分けつ、開花、結実など作物の代謝を高める。



セルイースト

20kg入 果菜類：10a あたり 6～8 袋
葉菜類：10a あたり 5～7 袋

酵母発酵製品をベースとした有機質ペレット肥料！

商品特性

窒素全量	リン酸	カリ
6.0	8.0	3.0

- ビール酵母細菌壁＋濃縮トウモロコシ蛋白の相乗効果で、成長力を最大限に引き出し、高収量・高品質な野菜作りを目指すことができる。
- シリーズとして肥料成分「8-10-7」「12-8-8」も取り揃えている。



万能ぼかし

20kg入 元肥：10a あたり 8～10 袋

魚・植物を特殊発酵した有機 100%ぼかしペレット！

商品特性

窒素全量	リン酸	カリ
4.6	4.2	2.8

- 国内産魚粕をはじめとする動物有機と植物有機等の有機資材を熟成発酵させたぼかし肥料。
- 土壌の団粒化を促進、好気的発酵により活性化された土壌微生物により、土壌の化学的性質の改善が期待できる。



カリプラス

20kg入 10a あたり 2～3 袋

天然加里肥料で加里不足を解消！

商品特性

リン酸	加里	苦土
2.8	30	3.4

- 油やしから焼成した天然加里肥料です。
- 根張りの促進、開花、結実の促進をはじめ果実の肥大に役立ちます。
- 珪酸、カルシウムをはじめその他微量元素も多く含まれており、植物の免疫力を向上させ健全生育に役立ちます。



里山ぼかし

20kg入 果菜類：10a あたり 8～10 袋
花卉類：10a あたり 8～10 袋

バチルス菌を添加した有機 100%ぼかしペレット！

商品特性

窒素全量	リン酸	カリ
6.4	5.5	3.1

- 有益な細菌類が土壌中の微生物の活動を活発にし、有機物独特の緩効性に優れ、長い効果が持続する。
- ペレット状のため作業効率が良く、元肥・追肥ともに使用できる。
- 味や日持ち等の品質向上に役立つ。



魚粕名人

20kg入 10a あたり 6～8 袋

アミノ酸が豊富に含まれた有機 100%ペレット肥料！

商品特性

窒素全量	リン酸	カリ
7.0	4.0	2.0

- 動植物性原料のみで作られた、有機100%ペレット肥料。
- アミノ酸・ビタミンが豊富に含まれており、着果や結実を旺盛にし、色艶・旨味・鮮度など作物の品質向上に最適。
- 肥料効果が早く、その後も緩やかな持続性を発揮する。



イーストパワー

15kg入 10a あたり 10～15 袋

作物と土壌の総合活力剤！

商品特性

窒素全量	リン酸	アルカリ
3.3	2.3	19.5

- 菌体肥料・植物粕・カニ殻・有機石灰・食品酵母などを配合し、水分約5%に濃縮したペレット状肥料。
- 天然の腐植酸を約14%含有し、土壌団粒の形成を促進。
- 土壌の微生物相を改善し、連作障害を抑制する効果がある。



バイオソル



好評

25kg入 10a 当たり 3～6 袋

土壌改良効果を持った有機質乾燥菌体肥料！

商品特性

窒素全量
6.0

- 有機質乾燥菌体肥料で、土壌中の菌根菌を活性化する。
- 土壌の団粒構造を構築・安定させ、発根作用が強くなり、生育が健全旺盛になる。
- 分解性の高いキチン質を多く含み、また有用微生物のエサとなる特殊有機物を使用している為、土壌病原菌を増殖させにくい。
- 発根促進の作用があり、また地力チッソとなる植物性チッソを含み、増収、丈夫な体づくりに役立つ。
- 特殊有機分が抵抗性誘導効果を植物にもたらし、問題を生じにくい体づくりに役立つ。また、Fe のキレート化物質も含んでいる。
- 堆肥または有用菌資材を同時施要する事でより良い効果ができる。(アンナプルナとの相性が良く土壌改善をより早く行う。)



ガッテン菌力

きんりよく


20kg入 10a 当たり 7～10 袋

有効善玉菌ゾーン土壌改良剤！

商品特性

窒素全量	リン酸	カリ
4.0	3.0	2.0

- バチルス菌や好熱菌、光合成細菌、菌根菌など多種の有効善玉菌を配合。
- 有効善玉菌が作物の根圏にゾーンを構築し土壌環境を改善することで、悪玉原因菌（フザリウムやセンチュウ類など）を根の周りに近づきにくくする。
- 土壌消毒に耐性を持った悪玉耐性菌の増殖を抑制する。
- 窒素・リン酸・カリも含有し、施肥の軽減が見込める。
- ペレット状なので散布も容易に行うことができる。
- 全面散布を基本とし、耕土は 15～20cm が目安。



酵素・で・くさ～る



15kg入 稲わら・野菜残さの分解：10a 当たり 3～4 袋
太陽熱消毒時：10a 当たり 8～10 袋

酵素のパワーで分解促進

商品特性

窒素全量	リン酸	カリ
3.0	4.0	1.0

- バチルス菌をはじめ有機物分解酵素を生み出す微生物が1gあたり1億個以上生きたまま含まれている。
- 稲わら・野菜残さなどの分解促進、緑肥の腐熟促進、堆肥の発酵促進に効果的。
- バチルス菌は耐熱性があるためペレット製造時に死滅せず、太陽熱消毒にも使用でき、胞子を形成するため保存にも耐えられる。
- 化学農法による土壌消毒後もすばやく増殖し、土壌微生物相を改善する。
- 好適pH範囲は4.5～9.0と広い。(製品のpHは7前後)
- ペレット状で播きやすく、機械散布も可能。



アンナプルナ アンナプルナペレット



アンナプルナ 15kg入 元肥：10a 当たり 4 袋

アンナプルナペレット 12kg入 元肥：10a 当たり 4 袋～

微生物の働きで地力・肥効・根活力 UP

商品特性

- みみず堆肥を主原料とし、6種類の優良微生物を配合した100%有機質複合菌体土壌改良剤。
- バクテリアゼーション（有用根圏微生物を土壌に接種すること）により根圏における有用微生物の占有率を高め、病原となる菌類の活性を低下させることで、土壌の生物相を改善し、土壌病害や連作障害の軽減に貢献する。



■アンナプルナに含まれる菌体の概要

菌体名	期待される効果
バチルス メガテリウム	カリウムを効率的に吸収する菌体。繁殖力が特に強い。
フラテウリア	土壌中に固着したリン酸を水溶化し、植物体に吸収されやすくする。
アソトバクター	窒素固定細菌の役割を持つ好気性菌。植物ホルモンを作り、植物の成長を促進させる。
アソスピラム	発根促進・植物活性に効果がある。共生菌のため、育苗期からの使用がより効果的。
シュードモナス	植物と共生し、外敵から守る土壌細菌。根腐れや青枯対策に効果が期待できる。
トリコデルマ	病原菌に対する拮抗作用がある。病害防除の他、樹勢強化が期待できる。

■アンナプルナ使用のねらい

土壌消毒後に有用菌を接種し生育環境を整える！

みみず堆肥の働きで地力向上・施肥軽減で省力化！

シュードモナス菌・トリコデルマ菌の働きで病気の発生を抑制！

他4菌種の働きで植物の養分吸収・生長を促進！

バイテクバイオエース



15kg入 10a 当たり 10 袋
太陽熱消毒時：10a 当たり 20 袋

根と土を改善する有効微生物肥料

商品特性

- 6種類の複合菌入り連作土壌障害対策の微生物入り土壌改良材。
- 植物共生菌の働きで病原菌の侵入を防除しながら、養分吸収を活発に行い、生育促進に期待できる。
- 植物体そのものが強くなり、後半まで安定した生育を助長する。
- 複合菌はカリの吸収を上げ、固着リン酸の水溶化で吸収し易くさせる。窒素の固定・養分吸収活発化・病原菌拮抗作用・病害予防・樹勢強化等の効果が期待できる菌が含まれている。
- 有機質100%の資材でココピート・ニーム・ミミズ堆肥等を原料にしており、保水性・保肥性・通気性の向上・団粒構造促進や地力の向上に役立つ。



ロッキー天然フルボ(粒)

好評

15kg入 10a 当たり 畑 : 40 ~ 60kg
施設 : 50 ~ 70kg

土から生まれ、土を生かす！

カナディアンロッキーの天然腐葉土から産出される天然のフルボ酸です。地力の向上、根の活性化に役立つ他、強力なキレート能力で肥料成分の吸収・有害物質の排出を促進し、土壌バランスを整えます。

- 商品特性**
- 腐植酸は土壌中微生物の活性化やそれに伴う土壌物理性の改善、保肥力の向上などに効果がある。
 - 腐植酸の中でも pH に関係なく溶解する「フルボ酸」は、作物の根から直接吸収され、発根促進（植物ホルモン類似効果）など、作物への直接的な効果を示す。
 - 「フルボ酸」は強い「キレート能力」を持ち、土壌中の肥料成分等の吸収・有害物質の排出を促進するため、土壌のリン酸固定の軽減や、ミネラルの吸収増大に効果を発揮する。
 - キレート化により土壌成分のバランスが整い、雑菌やセンチュウ等の生息・繁殖しにくい環境を作ること、土壌病害の抑制が期待できる。



化学的な効果

- ・CEC（陽イオン交換容量）の向上（フミン酸、フルボ酸の働き）
→肥料の流亡を防ぎ根吸けのリスクの軽減します。
- ・リン酸固定化の軽減（主にフルボ酸の働き）
→土壌成分の鉄やアルミと結合しているリン酸をフルボ酸が鉄やアルミと結合してリン酸の有効化をします。



フルボ酸とは

植物などが微生物に分解され堆積した土壌中の、腐植物質の中のフミン酸に含まれ、その中から生成される。フルボ酸は天然のフミン酸のみに含まれている。



つぶっこ堆肥

15kg入 元肥：10a 当たり 10 ~ 30 袋

堆肥散布をお手軽に！

- 商品特性**
- | 窒素全量 | リン酸全量 | カリ全量 | 炭素窒素比 |
|------|-------|------|-------|
| 3.2% | 3.6% | 2.0% | 10 |
- 国内で発生する有機資源を堆肥化し、ペレット状に加工した堆肥。
 - 食品加工工場からの野菜・肉・魚などと、木質チップが主原料。
 - 堆肥としての土作り効果と、肥料としての化成肥料減肥対策に貢献する。
 - ペレット状のため散布が容易。



アクセント

3kg入 元肥：10a 当たり 6kg

作物の生育向上、健康な体質つくり！

- 商品特性**
- 植物が元気に育ちやすくなり抵抗力を高めます。
 - 主成分のケイ酸と様々な栄養素がバランスよく含まれているため、感傷など様々な環境ストレスにも強くなります。
 - 作物がしっかり育ち病害虫に強く健康でたくましい植物に育てます。
 - 植物の生育に適した土壌環境を作るので微生物も活性化されます。



サトリア

1ℓ 葉面散布 500 倍、土壌灌水 1 ~ 2ℓ

作物の生育向上、健康な体質つくり！

- 商品特性**
- 糖蜜やブドウ糖、グリセリンなどがバランスよく配合されており、植物が元気に育つためのサポートをします。
 - 栄養の吸収を助けることで作物の品質アップにつながります。
 - 土中の微生物が元気に活動できるようになり通気性や保水性も向上して植物が育ちやすい環境を整えます。
 - 病害虫や様々なストレスに負けにくい植物本来の抵抗力を高めた丈夫な植物を育てます。



ホワイトカリウ 好評

20kg 入

カルシウムとケイ酸の長期補給に！！

商品特性

- ケイ酸とカルシウムは水溶性で非常に吸収されやすい。
- 土壌 pH の上昇が緩やかで、土を傷めずにケイ酸とカルシウムの補給が可能。
- ミクロ単位の多孔性が土壌に空気や水分を供給し柔らかくする。
- 保肥力を高め、根腐れを防止し、根張りを向上させる。
- ケイ酸は水溶性で作物に吸収されやすく、根張りの向上、茎葉の堅強化、結実性の向上などの効果が期待できる。

使用効果

- 茎葉を丈夫にし、病害虫・冷害・霜害に対する抵抗力を高め、健全育成を手助けする。
- 根の酸化力を高め、根腐れを防止する。また、根毛の発育を促し、根張りを向上させる。
- 肥料の流亡を防ぎ、肥料効率を高め保肥力向上に繋がる。
- 微生物の生育環境を良くし、有効微生物増加の手助けとなる。
- 酸性土壌を緩やかに中和する。



成分値(%)

保証成分	可溶性ケイ酸	アルカリ分	含有成分	全ケイ酸	カルシウム	マグネシウム	鉄
	17	17		55	25	0.3	1.5

【根張り向上と徒長予防】




●本葉2～3枚展開時のホワイトカリウ施用区と慣行区を比較したところ、施用区の方が全体的に苗の揃いが良好であった。根張りが格段に向上し、茎葉も徒長傾向が少なく、ガッチリとした健苗に仕上がった。



【根量・収量増加】



●窒素・リン酸・加里等の施肥は同条件で、ホワイトカリウ施用区と慣行区を比較した結果、施用区は根量が増え、太さ・重量も向上し、収量性が向上した。



ホウ作畑 好評

15kg 入

元肥：10a 当たり 2～3 袋
追肥：10a 当たり 1～2 袋

ミネラルの総合補給に新提案！

商品特性

- ホウ素要求の多いアブラナ科等の農作物の為に作られた、ホウ素強化型ミネラル肥料。
- 窒素・リン酸・カリ・石灰以外の農作物が必要とする成分が全て含まれている。
- ホウ作畑に含まれる成分は、水溶性で溶けて農作物に吸収される。
- 根張りが良くなり、収量と秀品率が向上する。

■ブロッコリーホウ素欠乏



◀上から見た時に一見問題のなさそうなブロッコリーも、横から茎を見るとかさぶた状のひび割れを生じている場合があります。ホウ作畑は、こうしたホウ素欠乏症の予防に貢献します。

カルブレ EV 好評

15kg 入

元肥：10a 当たり 3～6 袋
追肥：10a 当たり 2 袋

pH を上げずにカルシウム・微量元素の補給！

商品特性


- 「弱酸性カルシウム」「水溶性マグネシウム」「水溶性微量元素」と、吸収されやすい「シリカゲル型ケイ酸」を含み、土壌 pH を上げることなくカルシウム・マグネシウムを補給できる。
- 窒素・リン酸・加里以外の成分を一度に施用できるため、省力化に貢献する。

①多量に必須な養分(多量要素)	②微量だが必須な養分(微量元素)	③生育に有用な養分
チッソ リンサン カリウム	カルシウム マグネシウム 硫黄	マンガン 銅 ホウ素 亜鉛 コバルト 鉄 モリブデン
		ケイサン

カルブレ EV (に含まれる成分(赤枠内))



菊における対照区の値を 100 とした時のカルブレンド区の指数



2ヶ所の試験圃場共、カルブレ EV 施用区の方が対照区と比べ葉色が濃く、茎径が太く、一本当たりの重量が重い傾向があった。

粒状ネオサプリ

20kg 入 野菜・花卉類 元肥：10a 当たり 5～7 袋

開拓地・連作による地力損耗地に最適！

- 商品特性
- ケイ酸、アルカリ分(カルシウム・苦土)、鉄、マンガン、その他微量元素を1材で補給することができ、地力の回復に最適。
 - 土壌pHの修正と栄養素補給が同時にできるため省力的。
 - 光合成の要となる葉緑素の生産・維持に鉄、苦土、微量元素は欠かせない。

含有成分例(%)

ケイ酸	鉄	アルカリ分	苦土	カルシウム	マンガン	ホウ素・銅・亜鉛・モリブデン
20～25	15～20	25～35	3～5	20～30	0.5～1	微量

グリーンパーフェクト

20kg 入 元肥：10a 当たり 5～6 袋

地力増強・ミネラル補給で作物を丈夫に！

- 商品特性
- 腐植・リン酸・鉄・モリブデン・ケイ酸の他、作物の生育に必要な各種ミネラル分を豊富に配合。
 - 土壌に良くなじみ、長期にわたって土壌酸度を矯正する。
 - リン酸とモリブデンの相乗効果で窒素同化を促進し、植物細胞を丈夫にすることで元気な作物へ。

保証成分	アルカリ	＜溶性苦土＞	含有成分	リン酸	モリブデン	ケイ酸	鉄	腐植
	45	3		10～20	0.1～0.8	7～15	7～10	3～5

シェルエース

20kg 入 10a 当たり 6～8 袋

土に地力！作物は強健に！ 有機JAS栽培適合資材

- 商品特性
- 有機由来の貝化石と、＜溶性苦土＞、各種ミネラル分を造粒し、マイルドな酸度修正効果と高い栄養補給効果が期待できる。
 - 苦土が葉緑素形成を促し、光合成を活性化させる。また、土壌中のケイ酸・リン酸の吸収を高め、品質向上に貢献する。
 - 多孔質構造の貝化石の使用で、有機物分解や土壌物理性改善に効果がある。

保証成分	アルカリ	＜溶性苦土＞	含有成分	石灰	ケイ酸	鉄	マンガン	リン酸	カリ	ホウ素	腐植
	45	10		32	25	2	0.2	0.5	0.4	80ppm	7

カルスター

20kg 入 元肥：10a 当たり 6～8 袋
追肥：10a 当たり 2 袋

水に溶けやすく、速効的にカルシウム・硫黄補給ができる！

- 商品特性
- 吸収性の高い硫酸カルシウムを有機バインダーで粒状化した肥料。
 - カルシウムと同時に硫黄も補給でき、速効性と持続性を兼ね備え省力化が見込める。
 - 溶出が非常に良く、効率的にカルシウム欠乏対策ができる。

硫酸カルシウム	内カルシウム	内イオウ	リン酸	ケイ酸・微量元素
80	35	15	0.5	含有



ネオグリーン M

10kg 入 10a 当たり 3～4 袋

果菜類・葉菜類のマンガン欠乏に！

- 商品特性
- マンガンが苦土の働きを助け、光合成を促進する。
 - 堆肥連用でマンガンが効きにくい土壌でも効果を発揮できる。
 - リン酸など土壌で吸収されにくい成分も効率よく吸収できる。
 - 発根促進、徒長防止等、品質安定・収量増加に役立つ。



ケ・セラサン

20kg 入 10a 当たり 5 袋

連作障害予防効果剤

- 商品特性
- 粘土鉱物を主成分として必要な無機成分を粒状化し、抗菌性ポリマーをコーティングしたセラミックス土壌改良剤。
 - 水による溶出速度を調節し緩効性のため、長期にわたって酸素を発生させることができる。
 - 多孔質で表面積が多いため、吸水性・通気性・保肥力を向上させる。



医王元素

20kg 入 元肥：10a 当たり 4～6 袋

天然有機総合ミネラルで土壌を健康に！

- 商品特性
- 医王元素は多孔質で微量元素を多く含む天然鉱石。
 - 多孔質により保水性、肥料の吸着に優れ肥料の流亡を防ぐ効果と過剰吸収を防ぐ。
 - ケイ酸をはじめ微量元素を多量に含む為作物の生育を健全に保ち病害に強い体質になる。
 - 毛細根を増やし、地上部の生育を助け増収に期待ができる。
 - 節間を縮めて丈夫な作物をつくるので、倒伏軽減や環境ストレスの軽減にも役立つ。

NEW



息吹プレミアム

20kg 入 元肥：10a 当たり 3kg

土壌の団粒化促進で土中の水環境が変わる！

- 商品特性
- 息吹は酸化還元触媒の機能を持たせた土壌改良材。
 - 土中の水を調整して土壌粒子の結合を防ぎ土壌の団粒化の促進を促す。
 - 土壌の隙間をつくり水はけ、水もちを向上させるので根張の向上や土中に酸素や肥料成分がいきわたりやすい環境を作る。また土壌に微生物が住みやすい環境を作るので健全な土壌作りにも役立つ。
 - 肥料効果や水環境の向上により収量アップ、高品質の作物作りにつながる。

NEW



ナカガミのタネ

「亜リン酸」だからシャープに効く！

亜リン酸配合液肥

シャープ液肥



ワン 7-5-5 ツー 2-8-8 スリー 8-2-5

用途で選べる 3 種類

	生育促進	葉色改善	樹勢強化	着果促進	果実根茎肥大	花芽分化	徒長抑制	品質向上
ワン	○	◎	◎	○	○		○	
ツー				◎	◎	◎	◎	◎
スリー	◎	◎	◎					○

特徴

- リン酸は全量「亜リン酸」を使用
- 葉面散布・土壌灌注の両方に使用可能
- 他の液肥や水溶性資材との混用も可能

使用方法

葉面散布・・・500 倍～1000 倍希釈

灌 注・・・5 ℓ から 10 ℓ (原液量) / 10 a

2021 年
8月実施

夏の短期育苗における
シャープ液肥灌注試験より
播種後 20 日の苗の様子


短期育苗全般には

シャープツー

後半の追込みに

シャープワン

の使用がオススメ！



- ・短期育苗では培土の元肥だけでも生育は可能だが、25 日を超えると肥切れしてくる



- ・生育が早く揃いも良好
- ・葉脈、葉色が濃く根量も多いガッチリとした健苗に！



- ・短期育苗全体に使用すると茎葉が過肥大気味に
- ・後半の肥切れ対策に最適！

効率よくカルシウムを補給

メイクアップ

機能性カルシウム液肥

発根や細胞分裂に必要なカルシウムを補給
吸収しやすい有機酸カルシウムを配合
ビタミンB群が光合成を促進し生育をサポート

特徴

- 吸収率が非常に高い水溶性の「有機酸カルシウム（プロピオン酸カルシウム 23%）」を使用し、細胞壁構造の維持・強化に欠かせないカルシウムを効率よく補給します。
- 浸透性・移行性に優れたビタミンB群が、生長点まで速やかにカルシウムを運びます。
- ビタミンB群が光合成を促進し、茎葉・根を活性化させることにより、生育向上・収量増加に貢献します。

規 格 1 kg ・ 10 kg

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 石灰硫黄合剤などアルカリ性農薬とは混用しない。
- 散布適期を失しないよう散布する。
- 散布時には展着剤を加用する。
- 散布当日の降雨は効果が減るので、天候を見極めて散布する。
- 農薬と混用する場合、農薬ラベルに記載されている注意事項を守る。

標準使用例

作物名	期待される効果	使用間隔	希釈倍率	使用回数
野菜類 果樹類 畑作物全般	発根促進 生育向上 収量増加	7～10 日 おき	1000 倍	適宜 (3 回以上)

使用上のポイント

1 欠乏症が発生してしまうと回復しにくいので、発生前に早目の予防散布を行う

2 欠乏症の出やすい花房・果実・新葉・生長点・結球部などは特に丁寧に散布する

3 定期的な散布間隔で、十分ムラなく散布する



揃いと品質の向上が確認された事例

メイクアップ液肥使用区は、無使用区に比べて塊根のサイズ揃いが良く、収量が増加し、形状もきれいで安定したものに仕上がった。
また、使用区は収穫時の土離れも良好であった。

業界初成分配合！
バイオスティミュラント

希少脂肪酸のチカラ

リーフエナジー

LEAFENERGY

リーフエナジーは植物に若々しさと活力を与え
安定した生育、品質、収穫をサポートします。

ポイント

業界初の成分

●業界初となる希少脂肪酸を成分とするバイオスティミュラントです。

安全性の高い資材

●天然由来のため、植物・人・地球環境に対して安全性の高い資材です。

植物のストレスを緩和

●高温、干ばつ等の様々な外的要因によるストレスを緩和し、健全な成育をサポートします。


●干ばつストレス条件下でのリーフエナジーの効果

作物＝レタス 散布期＝2～3葉期
観察日＝リーフエナジーの散布2週間後
※観察日までの1週間は灌水せずに放置




●収量・食味への効果

作物＝イチゴ 栽培条件＝定植9月5日、
収穫11月～翌年4月末まで
施用条件＝定植の2週間前より



活葉の促進により初期成育がよくなった結果、年内の収量が14%増加した。



健全に生育した結果、全体収量が6%増加した。

食味への効果 糖度比較 ※試験条件は上記と同様
平均 10.4<11.7



測定結果 (Brix%)

施用なし 施用あり

糖度 UP

リーフエナジーによる 糖度向上のメカニズム

①リーフエナジーにより
葉の中の糖分量向上

②株が高いエネルギーを保持

③健全に生育する

糖度の高い果実へ成長



規 格 500ml

使用方法	使用時期	希釈倍率
灌注処理	定植3日 処理	100 倍
葉面散布	7日～14日 おき散布	1000 倍

Alberta
Canada



black earth

ロッキー天然フルボ プロ

カナダ・アルバータ州で採掘される亜瀝青炭を原料に、

腐植物質の中で唯一の水溶性成分の **フルボ酸** のみを抽出し製品化しています



ロッキー天然フルボ プロ 液 の効果

- ① フミン酸を除去し、フルボ酸のみの為、様々な液肥と混用が可能！！
- ② キレート効果
両性の性質（正、負の両方に帯電）をもつフルボ酸は金属微量元素と強い複合体を形成します。→キレート効果
フルボ酸は他のキレート剤と違い植物と一緒に直接吸収され、植物組織全体に運ばれます。
- ③ 光合成促進効果
フルボ酸には、細胞の発達の構成要素である芳香族炭素環が含まれています。植物の葉と根が発達し、光合成の効率が上がります。低日照時でも炭素（フルボ酸）が供給されることによりアミノ酸化（同化）が促されます。
- ④ 植物活性効果
植物ホルモンの働きを活性が促されます。（オーキシン、サイトカイニン、ジベレリン、アブシジン酸など）→様々なストレスから作物を守ります。
光合成促進、抗酸化物質の生成促進により暑さストレスも軽減します。

規 格 2ℓ・5ℓ・20ℓ

使用方法

- 葉面散布（農薬散布時に混用可）1000倍～2000倍→微量元素剤との混用時や10日間隔より短い間隔での散布の場合は薄く使用する。
- 灌水に混用の場合は300cc～500cc/10a（直時の発芽水の場合も）
- 溶液栽培は溶液の基タンクの液量に対して1000倍量

分析例
（日本肥糧
検定協会）

ph	 7.9	加里	 0.06%
窒素	 0.03%	石灰	 なし
リン酸	 なし		

ロッキー天然フルボプロは.....

低日照、多雨、台風、高温などの作物のストレスへの予防、回復にとっても効果が有ります！！

12種類の成分が作物を即効元気にさせる!! **RICH**

ミネラルリッチ

作物に必要な12種類の成分を配合し、健全な生育をサポートします。

苦土を主成分として、マンガン・ホウ素・鉄・銅・亜鉛・モリブデンの微量元素に加え、リン酸・カリ・カルシウム・トレハロース・クエン酸を含んだ粉状液肥です。

使用効果

- ▶クエン酸を含むため、土壌中のリン酸や微量元素を溶かし有効活用することができます。
- ▶各種微量元素とクエン酸で定植時・初期成育時の活着を促し、ストレスのない初期成育を促します。
- ▶苦土・マンガンをはじめ微量元素が葉緑素の生成を活発にし、光合成を盛んにします。
- ▶各種微量元素とクエン酸の効果で、定植時・初期成育時の活着を促進し、ストレスのない初期成育をサポートします。
- ▶天候不順などによっておこる要素欠乏や生理障害、生育不良などの回復に役立ちます。



規格 5kg

※使用上の注意

- ・銅剤との混用は薬害が出る恐れがあるので避ける。
- ・石灰硫黄合材などアルカリ性農薬とは混用しない。

保証成分(%)				
リン酸	カリ	苦土	マンガン	ホウ素
1.0	1.0	15.0	6.0	2.0

含有成分(%)						
カルシウム	鉄	銅	亜鉛	モリブデン	トレハロース	クエン酸
1.52	1.17	0.07	0.11	0.05	5(以下)	5.4(以下)

使用方法

- ・葉面散布する場合は 500 倍～ 1000 倍を月に 1～2 回散布します。
- ・土壌処理する場合は 500 倍に薄めて灌水します。

シーピーエス

CPS

NEW

10ℓ

葉面散布：1000 倍 土壌灌水：10a あたり 300ml～500ml

独自製法で抽出された海藻濃縮資材！

- 海藻を物理抽出しているため、加熱や薬液抽出と違い有効成分を損なわずに高い成分を含有している。
- ポリフェノール、マンニトール、ラミナリン等を多く含む植物にたいしての乾燥、紫外線、干ばつなど環境ストレスへの耐性の向上、ダメージの回復に役立つ。
- 抗酸化作用に効果が期待できる有効成分を含む。
- 作物の自己防衛力を高める事が出来、細胞内の水分を保持し乾燥や激しい温度変化によるダメージの軽減をする。
- 抗酸化作用の効果により細胞の老化を遅延することが期待できる。
- 発根促進効果があり、太い根を作るとともに細根も旺盛にすることで作物の生育を良くし丈夫な体作りをする。
- 肥料の吸収力を高める為、茎が太くなり、葉は厚く葉色がよくなる。
- ミネラル分の養分吸収も高め健全な作物を作る。



とうきょうえいと

東京8




好評

10ℓ

葉面散布・灌注処理：100 倍、土壌灌水：10a 当たり 1ℓ

1500 種類を超える微生物のチカラで農業をパワーアップ!!

- 「東京8」は1500種類以上の多種多様な微生物を含んだ、有機JAS認定資材登録済（登録番号 JASOM-220401）の微生物活性剤（バイオスティミュラント）です。
- 多種多様な微生物が存在するため、様々な環境において、色々なニーズに応えることができる微生物社会が形成されている。・有機微生物の働きで病原菌をコントロールし、作物を強くする。
- 健康な土地から十分な栄養を摂取できるので、作物の成長促進につながる。・土地の団粒化を促進し、土壌の改良と安全をはかることができる。



肥料成分はほとんど無いが……
どんな環境でも効果を発揮
複数の機能を有する

培土・肥料・土壌改良剤

ギアアップ

1ℓ入 要面散布：1000 倍

収穫強化肥料！

商品特性

- 独自製法で極小分子化した葉面吸収に最適化された高活性腐植酸 AOA を配合してる。
- AOA とは活性部位が増加した、極めて活性の高い腐植酸。
- 高活性腐植酸 AOA が葉内部の奥深くまで浸達するので従来の腐植酸資材より効果が高い。
- 養分転換、転流を加速し着花、着果、果実肥大を促進する。
- 秀品の収量増加と長期獲りでの収益増加につながる。



Tecamin Max

6 kg (5 ℓ) 月に 2 ～ 4 回を毎日に 1000 ～ 2000 倍希釈で葉面散布

1.2kg (1 ℓ)

高濃度アミノ酸が植物のストレスを軽減！

商品特性

- 各種アミノ酸、特に植物の生育に必要なたんぱく質を作るグルタミン酸を豊富に含む葉面散布資材。
- 植物の生育促進、曇天・低温などによる光合成能力低下時のストレス状況下で生育をサポートする。

こんな時にお使いください！

- ◇根からの養分吸収が弱い。
- ◇農薬との混用で効率的に葉面散布したい。
- ◇暑熱期に苗質を維持したい。
- ◇曇天・低温続きで生育が悪い。
- ◇生育を早めたい、実入りを良くしたい。



シーマロックス液肥

1 ℓ入 葉面散布：1000 ～ 2000 倍に希釈

10 ℓ入 灌水：10a 当たり 500cc ～ 1 ℓ (原液量)
土壌混和：10a 当たり 3 ～ 5 ℓ (原液量)

発根、根張りがバツグン！

高収量・高品質！

商品特性

- 多種類の微量要素を配合した液体肥料。
- 作物の葉緑素を増やし、光合成能力を高めることで、高品質（食味・糖度・玉伸び・色つやの向上、鮮度保持など）の秀品生産を可能にする。
- 耐病性や食味の低下を招く硝酸性窒素をアミノ酸に転化させ、低硝酸化に役立つ。
- 発根を促進し肥料の吸収を高め、低硝酸化による耐病性向上との相乗効果で連作障害の軽減、減肥、減化学資材農業に貢献する。



ALA GARDEN

1 kg 入 (787ml) 入


茎葉散布：3000 ～ 4000 倍
土壌灌水：10a 当たり 80 ～ 120ml (原液量)
施肥間隔：1 ～ 2 週間

商品特性

- 葉緑素を増やし、光合成能力を増強、暗呼吸を抑制する。
- 環境ストレス耐性、硝酸還元酵素活性を向上させる。

使用効果

- 低照度・低温などによる生育不良の低減。
- 収量・品質の向上、なり疲れ対策・糖度向上。
- 葉色の改善、樹勢回復。
- 肥料吸収能力の向上、施肥効率の向上。硝酸態窒素の低減。
- 水稻・小麦の登熟率向上。



サカタ液肥 GB

1 kg 入

葉面散布：1000 倍に希釈

10kg 入

施肥間隔：2 ～ 4 週間おき

商品特性

- 甜菜(テンサイ)由来の機能成分「グリシンベタイン」をはじめとする環境ストレスに強くなる成分を含んだ高機能液肥。
- 移植・定植時や生育初期に施用すると、根量を増加させ、根の活着が良くなる。
- 定期的に散布することで植物を元気にする。

使用効果

- 白く若々しい根(細根)の量が多くなる。
- 定植時に施用すると根の活着が促進される。
- 光合成の維持向上により植物が元気になる。
- 環境ストレス(高温・低温・乾燥)に強くなる。
- 萎れ・葉枯れ防止、収穫後の鮮度保持に繋がる。



ウェルグロー活～酸素剤～

20kg 入

灌水：100 ～ 300 倍に希釈
(5kg ～ 10kg (原液量) / 10a)
養液栽培：1000 ～ 5000 倍に希釈

過酸化水素水を基剤とした酸素供給剤です。土壌中の金属類や有機物などと反応し、植物の根に必要な酸素を確実に発生させます。

使用効果

- 根のスムーズな伸長を促進し、バランスよく養水分を吸収。
- 土壌中の悪玉菌(糸状菌)を減少させ、優良微生物(放線菌)を増加。
- 土壌の酸素バランスを良くし、長雨、冠水などによる根痛みを改善。
- スタビライザー(安定剤)により長期間効果が持続し長期保存が可能。




トレイン

5 kg入 葉面散布：500 倍
土壌灌水：10a 当たり 2 ～ 5kg

光合成促進・樹勢回復の決定版！

- 商品特性**
- 作物に必要な微量元素を高濃度配合し、酵素の活性化により光合成能力を促進させる。
 - 根張りが旺盛になり茎葉が充実し徒長を防ぎ、低温、長雨等の異常気象時に効果を発揮する。
 - 要素欠乏、生理障害を回復させ日持ち、生育の安定に効果を発揮する。
- 使用効果**



マグマ^{エスアイ} Si

500ml入 葉面散布：2,000 倍～ 10,000 倍

植物の体質改善！

- 商品特性**
- 細胞壁を強化することで丈夫で徒長しにくい植物体をつくります。
 - 発根力を強化させ太い根を張らす為、養分吸収が盛んになり成長を旺盛にします。
 - 太い根が土壌深くまで張る事ができ干ばつ対策にも役立ちます
 - 植物を固く健全に育てる事によりさまざまなストレスの軽減につながります。
 - 水分蒸散抑制効果により水分ストレス軽減で暑さ、寒さ対策にも強くなります
- 使用効果**



ナカガミのタネ 輝緑^{きりよく}

1 ℓ入 葉面散布：1,000 倍～ 2,000 倍

生育促進、健康な植物づくりに！

- 商品特性**
- 輝緑は、厳選された茶樹の葉と実より抽出された天然のカテキン類(ポリフェノール)を主成分としています。
 - 天然の微量元素が入っているため植物を元気にします。
 - 樹勢の回復や生育促進の効果。
 - ポリフェノールによって植物の抵抗力が増します。
- 使用効果**



イリゲイド 51

500ml入 ※使用量の目安 100 坪当たり 50 ～ 60ml (原液量)
播種または定植時から定期的に処理を行う。

土壌中の水分を最適にして生育を揃え、品質、収量アップ！！

イリゲイド・ゴールドの 3 倍濃縮タイプ

- 商品特性**
- 液肥等の資材や灌水等の水を根圏域までむらなく効率よく湿潤、浸透させ土壌水分のバランスを良好に保つ。
 - 土壌中の水と空気のバランスを良好にし、生育を促進する。
 - 土壌表面の水はけを良くし、余分な水を排水する。
 - 各種液肥剤との混用も可能。



アグロリューション・スペシャル 324

25kg入 茎葉散布：1000 ～ 2000 倍 土壌灌水：10a 当たり 2 ～ 3 kg

高い技術と栽培への知見によって開発されたオールインワンタイプ液肥！

窒素全量	リン酸	カリ	苦土	マンガン	ホウ素
13.5	7.8	21.5	1.8	0.07	0.03

アグロリューション・スペシャル 324 は高い技術と栽培への知見によって開発されたオールインワンタイプの液肥で、果菜類、果樹類に最適な成分バランスの製品です。
カルシウム・マグネシウム・微量元素欠乏を回避し、高品質な作物を栽培できます。軟水にも対応し、灌水システムをきれいに保ちます。

- 全ての肥料成分を 1 液で供給できる。
- 完全な微量元素をパッケージにしている。
- 養分の加給性を向上させる。
- 軟水に対応した酸性処方。
- 純度の高い原料を使用。
- 灌水システムのクリーニング効果があり、目詰まりを防止する。
- 容易に水に溶け、完全溶解する。
- 保存性を改善している。



かく しゅ たん び 各種単肥

各種単肥も取り扱っております。圃場にあわせて最適なものをご提案いたします。

- 硝酸カリウム
- 硝酸カルシウム
- 硫酸マグネシウム
- 第一リン酸カリウム
- 第一リン酸アンモニウム
- キレート鉄 等



オリジナル肥料を作いませんか？



- 商品特性**
- N-P-Kのバランスを指定し、有機成分・化学成分のバランスを決めながらオリジナルの肥料を作ることができます。
 - 粒状肥料の配合、混合のBB肥料としてのオリジナル肥料となります。
 - いろいろなパターンの物が作れますので、ぜひお気軽にご相談ください。

スミソイル 好評

45ℓ入 1000ℓ (フレコン) (128穴トレイ 11枚 / 45ℓ)

プラグトレイ育苗専用培土！

- 商品特性**
- 保水性、通気性、透水性に優れたプラグポット育苗培土。
 - 培土の品質が安定しているので均等な苗が育苗できる。
 - 苗の抜け性はもちろん、根鉢の保持が良いため定植作業が楽にできる。

商品名	窒素(N)	リン酸(P)	カリ(K)
N-60	60mg	140mg	60mg
N-100	100mg	250mg	100mg
N-150	150mg	350mg	150mg



プロソイル 好評

40ℓ入 128穴トレイ 10枚

根張りに違いを見せます！

- 商品特性**
- 保水性が高く、夏場の灌水回数を減少できる。
 - 根巻が早く、定植が早めに行える。
 - 根量が増え、定植後の活着がスムーズになる。
 - 保肥力が高く肥料の管理がしやすい。
 - 定植前の差し替え作業効率がUPできる。

商品名	窒素(N)	リン酸(P)	カリ(K)
プロソイル(N100)	100mg	1200mg	100mg
プロソイル(N150)	150mg	1100mg	150mg



エヌケー ばいど NK培土

40ℓ入 (128穴トレイ 10枚)

- 商品特性**
- 保水性、通気性、透水性に優れた育苗培土。
 - 根張りが良く定植後の活着が良好。
 - 軽量でトレイからの抜けが良く作業性に優れている。
- ※特注で N-100 も作れます。

商品名	窒素(N)
N-50	50mg
N-100	100mg



スーパーヤッシー

40ℓ入 (128穴トレイ 10枚)

- 商品特性**
- | 窒素(N) | リン酸(P) | カリ(K) |
|-------|--------|-------|
| 150mg | 400mg | 100mg |
- 播種から短期育苗に必要な養分がバランス良く配合されており、また初回灌水時の潑水も無い。
 - 葉菜類・果菜類の短期育苗、菊等の挿し木などに最適。



◆◆◆◆ヤッシーミックスシリーズ◆◆◆◆

はなよう ヤッシーミックス花用

容量 40ℓ、1000ℓ (フレコン)、
(128穴トレイ 10枚、72穴トレイ 8枚、3寸100鉢 / 40ℓ)

商品特性

窒素(N)	リン酸(P)	カリ(K)
210mg	600mg	95mg

- 緩効性肥料と若干の速効性養分が配合され、バランス良く根に必要な養分を供給する。
- スイカ・メロン・キュウリ等のウリ科の播種から幼苗期に最適。

やさいよう ヤッシーミックス野菜用

容量 40ℓ、1000ℓ (フレコン)、
(128穴トレイ 10枚、72穴トレイ 8枚、3寸100鉢 / 40ℓ)

商品特性

窒素(N)	リン酸(P)
210mg	200mg

- 厳選された有機物資材が主体の保水性重視型の野菜専用育苗培土。
- 野菜全般の播種培土として使用でき、短期間の育苗または追肥を前提とした育苗に最適。

こう ヤッシーミックス 3号

容量 40ℓ、1000ℓ (フレコン)、(3寸100鉢 / 40ℓ)

商品特性

窒素(N)	リン酸(P)
420mg	1065mg
カリ(K)	マグネシウム(Mg)
195mg	40mg

- 緩効性肥料と若干の速効性養分が配合され、バランス良く根に必要な養分を供給する。
- 野菜全般、特にウリ科やナス等の鉢上げ用ポット土として最適。

こう ヤッシーミックス 4号

容量 40ℓ、1000ℓ (フレコン)、(3寸100鉢 / 40ℓ)

商品特性

窒素(N)	リン酸(P)	カリ(K)
360mg	1080mg	160mg

- 保水性・排水性・保肥力のバランスを均等にしており、幅広い作物に使用できる。
- 特に野菜類（キュウリ、ナス、ピーマン、シシトウ等）、花類（パンジー、ペチュニア等）の育苗に最適。

アグリトップ マルハナ

(旧キャッツマルハナバチ)



飼育等の許可が必要です

商品特性

- 施設栽培の果菜類・果樹類などの交配(受粉)に利用できる。
- 国内生産飼育(西欧種)で、活性の高いマルハナバチ巣を商品化している。

アグリトップ クロマルNEXT



飼育等の許可は不要です

商品特性

- クロマルハナバチの小規模コロニーを商品化。
- 小面積施設や短期間の使用に最適。

ハニートーン (セイヨウ種)



飼育等の許可が必要です

商品特性

- 20年以上にわたるセイヨウオオマルハナバチの飼育の結果、現在までに考えられる最高の系統を選抜。
- 適切な環境下であれば1000卵以上の産卵を行う女王蜂を選抜することに成功している。
- セイヨウオオマルハナバチは日本では特定外来生物に指定され、使用が規制されている一方、世界ではさまざまな地域で活用され、トマトの他、昨今のミツバチ減少にともない果樹などの受粉にも積極的に利用されている。

アグリトップ クロマルDX



飼育等の許可は不要です

商品特性

- クロマルは、クロマルハナバチ(日本原産種)を国内で飼育した商品。

アグリトップ てきおん君



商品特性

- 巣内の生育環境を整え、働きバチが十分に正しい訪花活動を行えるようにする。
- 季節を問わず利用可能。冷暖房自動切り替え機能付き。
- 単相 AC100V、単相 AC200V の電源に対応

ハニートーン (在来種)



飼育等の許可は不要です

「アグリーンセクト PF シリーズ」で、LED で減農薬栽培をしませんか？

防虫灯 アグリーンセクト PF シリーズ

◆電気工事不要
(専用防水接続コード付き)

◆露地栽培対応・完全防水・
日本メーカー3年間保証付

◆従来他社防虫灯LEDより
も安い価格で同等効果



アザミウマ種に
効果のある赤

防蛾に効果がある
黄緑

防蛾に効果がある
緑

商品名	「アグリーンセクト PF」黄緑	「アグリーンセクト PF」赤	「アグリーンセクト PF」緑
点灯画像			
波長分布			
型番	(黄緑) AGCY-INSECT-YG	(赤) AGCY-INSECT-R	(緑) AGCY-INSECT-G
発光色	黄緑	赤	緑
LED数	基板1枚あたり 12個 x4枚	基板1枚あたり 12個 x4枚	基板1枚あたり 12個 x4枚
消費電力	25.9W	24.4W	25.9W
照度	278lx	41lx	342lx
放射照度	619mW・m-2	545mW・m-2	740mW・m-2
PPFD	3.0 μmol m-2s-1	3.0 μmol m-2s-1	3.4 μmol m-2s-1
全長	照明管部分 416mm・電源ケーブル長 1000mm		
直径(最大部)	照明管部分 63.5mm		
重量	865g(電源ケーブル、吊り下げ用ワイヤ含む)		
防水性	IP67 相当		

黄緑は、イネ科の作物に対しては、花芽分化抑制や徒長に繋がる恐れがあります。



アグリランプシリーズ (花芽抑制・成長促進用) LED

■ 製品仕様

品名	エースピンク	エース白タイプ	アグリランプ(赤)	アグリランプ(黄緑)	アグリランプ(緑)	アグリランプ(青)	アグリランプ(FR-HP)	アグリランプ(FR-MP)
型番	AC31	AC22	ACR660nm	ACG570nm	ACG540nm	ACB460nm	FRHP	FRMP
躯体画像								
発光面								
効果	花芽抑制効果	花芽抑制効果	アザミウマ忌避効果	防蛾専用LED	いちご用LED	みかん青色カビ病抑制	長日性植物成長促進用	長日性植物成長促進用

完全防水IP67：露地栽培対応

レディソル

20Kg 入

商品特性

- 高温期の熱や光から作物を守る。
- 濃度を調整することで幅広い遮光率での使用が可能。
- 1反あたり1缶で、約2～3か月間を目安に効果が持続する。



レディヒート

15Kg 入

商品特性

- 光質コントロール遮熱剤。
- 光合成有効放射光線をより多く浸透し、温度上昇の原因になる近紫外線を反射する。
- 1反あたり2～3缶で、約4～5か月間を目安に効果が持続する。



レディクリーン (除去剤)

20ℓ 入

商品特性

- レディソルおよびレディクリーンを塗布面から安全、確実に取り除く。
- 1缶で約8a分のハウスに使用できる。



アキレス ファインシェード

15Kg 入

商品特性

- 吹き付けることによりハウス内の温度上昇を抑え、品質の向上や、ハウス内での作業負担の軽減に効果的。
- 被覆資材に優しい原料で、被覆資材を傷めない。
- 1反あたり1～1.5缶で、約2～3か月間を目安に効果が持続する。



ドローン散布専用遮光材 ファインシェードスカイ

商品特性

- ドローン(無人小型航空機)を使った空中散布用に開発した農業用被覆資材(農ビ・農PO)向けの遮光材。
- 希釈不要のため短時間で効率よく作業が行える。
- 危険な高所作業が不要で、遮光に要する作業時間を大幅に削減できる。
- ドローンで均一に吹き付けでき、ハウス内の温度上昇を適度に抑制して作物の葉焼け、しおれを軽減する。

遮光率(約20～30%)

散布可能面積(1缶での散布可能面積)約500m²

※：噴霧器の種類、フィルム基材によって吹き付け状態が異なることがある。



ピストル噴口ALD

商品特性

- 片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストルタイプ。
- 到達性に優れ、高木及び洗浄にも最適なノズル。

噴霧状態 / 圧力 MPa		1.5	2	2.5	3
水量 (L/min)	直射	13.5	15.6	18	19.4
	噴霧	4.7	5.4	9.2	10
到達距離 (m)	直射	11	12	15.5	16
	噴霧	4.5	5.5	6.5	7.5



ら～くらくスーパーホワイトライト

商品特性

- 反射率約80%以上を誇るスノーテックス素材を使用することにより、高い遮光・遮熱効果を実現。
- 太陽光を反射・拡散して遮光・遮熱効果を発揮しつつ、チタンホワイト系による高い遮光率を保ちハウス内が暗くなることを防ぐ。
- 熱融着品なのでハウス部材への引っ掛かりを軽減。
- 軽量で作業性、耐久性に優れた被覆素材。

品番	色	材質	遮光率 (%)	規格
L25	ホワイト	ポリエチレン	20～25	ご希望のサイズに合わせて縫製加工を承っております※10cm単位です
L35	ホワイト	ポリエチレン	30～35	
L45	ホワイト	ポリエチレン	40～45	
L55	ホワイト	ポリエチレン	50～55	
L65	ホワイト	ポリエチレン	60～65	
L75	ホワイト	ポリエチレン	70～75	



ワリフ 明涼

商品特性

- 熱源である赤外線を反射することでハウス内の温度を低下させる。
- 伸び縮みがなく、交点は熱融着のためカットしても目ずれしない。
- 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れる。
- 軽量で取扱いが容易。

- 可視光線の透過率

明涼 20 : 約80%

明涼 30W : 約70%

明涼 40 : 約60%

明涼 50 : 約50%

◆規格

品名	遮光率 (%)	幅 (cm)	長さ (m)
明涼 20	20	100 210	100
明涼 30W	30		
明涼 40	40		
明涼 50	50		



ダイオネオシェード清冷

商品特性

低遮光・高遮熱資材

- 特殊熱線吸収材入り。ハイスpek遮光により温度が上がりにくい。
- 作物の葉面温度を下げることで夏場の高温障害の軽減になる。

品番	遮光率	色
820SRI	約25～30%	クリアグレー
1020SRI	約35～40%	
1220SRI	約45～50%	



メガクール

商品特性

光質コントロール

- 太陽光線の熱線を吸収し、植物体温や地温の上昇を抑制。
- 夏期栽培における作物の高温障害(葉焼け、発根不良、裂果など)を回避。
- 夏期のセル成育苗やポット苗の徒長を防ぎガッチリとした苗ができる。

種類	加工品幅 (m)								長さ
	2	3	4	5	6	7	8	9	
ネット	●	●	●	●	●	●	●	●	1m ぎざみでカット



塗布無滴遮熱農 PO クール ON



近赤外線と遠赤外線の透過率をコントロールすることにより、

- ①夏期：ハウス内の温度上昇を抑制します。（作物の高温障害軽減効果）
- ②冬季：夜間の放射熱による温度低下を防ぎ、地温・気温を高く保ちます。


全国で展張試験を行った結果、優れた遮熱性と保温性が実証されました。

①遮熱性

展張事例1：関東地区

試験区：クール ON（150μm厚）
対象区：ダイヤスター 作物：トマト
※対象区（ダイヤスター）対比、夏季日中のハウス内気温が3～5℃低い傾向。

(気温)	ハウス内気温		外気温
	クール ON	ダイヤスター	
平均	29.1	29.5	27.7
最低	21.1	21.0	18.9
最高	43.4	46.6	40.2



②保温性

展張事例2：北海道地区


試験区：クール ON（150μm厚）
対象区：ダイヤスター UV カット 作物：カブ
※対象区（ダイヤスター UV カット）対比、冬季夜間のハウス内気温が同等。

(気温)

	クール ON	ダイヤスター UV カット
平均	8.8	8.7
最低	-4.6	-4.9
最高	40.4	44.0

(地温)

	クール ON	ダイヤスター UV カット
平均	10.0	9.9
最低	5.8	5.2



製品規格

性質	厚さ(mm)	幅(cm)
防霧・塗布無滴・遮熱	0.15 0.1	※最寄りの販売店、代理店にご相談ください。

◆被覆素材（外張）PO フィルム

耐久無滴農POフィルム

スーパーダイヤスター (厚さ 0.15mm)

- 8年連続展張を実現。
- 新配合剤の採用で更に耐久性（強度・透明性）UP。（ダイヤスター比較）
- 良好な透明性を保持する。
- 新配合技術によりスッキリした透明感が向上。



耐久無滴散乱光農POフィルム

美サンランスーパーダイヤスター (厚さ 0.15mm)

- 午前中の急激な温度変化を和らげ葉焼けを防止する。
- 作物、パイプの影がでにくい。

◆長期張りフィルム

エフクリーン

規格／自然光、GR、GR80、UV、ナシジ、シルバー、ホワイト
厚さ／0.08mm、0.1mm

- 透明性に優れたフッ素樹脂を原料にしており、太陽光を殆どそのまま通すフィルム。



▲ナシジ

タイキュート 007

- 透明性が高く、耐久性、無滴性に優れる。
- 特殊樹脂の採用と、フィルムへの表面処理により、10年展張可能な強度と耐久性を発揮する。
- 透明性が高く、ハウス内に太陽光をしっかりと透す。

◆被覆素材（外張）PO フィルム系

アキレス ハイボールコート

特殊メタロンセン処方により強度アップ。（厚さ0.1 0.13 0.15）

MKV ダイヤスター(UVカット)

抜群の透明感。UVカットでは病虫害抑制効果がある。（厚さ0.15）

アキレス ハイボールクール

近赤外線の透過量を下げることで、熱線が抑えられハウス内の温度を下げる効果あり。（厚さ 0.13 0.15）

MKV 美サンランダイヤスター

ハウスの中に入る光線が適度な散乱光となり、光がゆきわたる。（厚さ 0.15）

花野果、バーナル など

ハウスならナカガミにお任せください！

屋根型ハウス



パイプハウス



予算に合わせて
最適なハウスをご提案致します！



丸型ハウス



カーテン素材（内張フィルム）

さまざまなフィルムを取り扱っております。
ぜひご相談を！



ハーモニー 52150



カムファイン WHR40



シェード



テンパ 5557D



快適空乾

三州 暖房機



- クリーンな燃焼とさわやかな風を地球と作物のためにご提案。



ネポン ハウスカオンキ30V型

- 通信機能&専用アプリで省力化。
- 送風ファンをDCモーター採用で省エネ。
- 新型コントローラーで操作性UP。
- ホワイトカラーで採光を有効活用。



29V 型(通信機能なし仕様)

ネポン グロウエア

植物の生長を活性化

- 機器の運転はタイマー式で簡単操作。
- 循環暖房機との連動運転もできるので、CO₂の拡散効率が良い。

フルタ ZOシリーズ


- タイマー運転や4ステップ時間帯による炭酸ガス濃度の制御ができ、無駄なく供給が行える。
- オプションで吹き出し高さ調整ダクトを用意。

炭酸ガスの供給によって光合成を促進し、増収や品質向上が可能です。

CO₂局所施用ダクト

CO₂局所施用ダクトの
基本仕様

- 折巾 160mm (φ100)
- 穴サイズ (φ3mm、φ4mm)
- 穴ピッチ 20cm



保守点検受付中！

重油 15kl～20kl使ったら、ノズル交換をしましょう！
缶体、バーナー、ノズルなどの部分的な点検も承ります。



清掃



交換



根こぶ病



- 症状** ●主根に大きなこぶが形成され、地上部の生育が停滞し晴天時には萎れ症状が発生する。
- 原因** ●糸状菌の一種で絶対寄生菌。土壌伝染。根にこぶを形成。こぶ内で形成され休眠胞子が、こぶの腐敗と共に土壌中に分散。休眠胞子が土壌中で発芽。第一次、第二次遊走子を経て根の皮層へ侵入、増殖。多数の休眠胞子を形成。感染し組織は肥大して巨大なこぶを形成します。
- 対策** ●石灰資材等により土壌 pH を修正する。
●登録農薬による土壌消毒、防除を行う。
●根こぶ病に強い品種を選択する。
●作付け時期を検討する。

黒腐病



- 症状** ●葉緑に、葉脈を中心として外側に広がる V 字型の黄色の病斑を生じる。
- 原因** ●細菌性の病害で生育初期～中期が秋雨、台風に遭遇する作型で激発する。被害は収穫期に目立つが主因は若苗時の下葉の感染が大きな原因。
- 対策** ●秋雨、台風時期の定期的な予防散布をおこなう。
●結球期前に銅剤等による予防散布をおこなう。
●中耕し排水に努める。

菌核病



- 症状** ●結球期以降に、下葉に水浸状の不規則な病斑を生じる。進行が進むと結球部全体が黒褐色に腐敗し、最終的にネズミの糞状の菌核を形成する。
- 原因** ●かびの仲間が原因とされ、土中に残った菌核が数年間感染源となり、菌核は 10℃～ 20℃の過湿条件が続くと直接菌糸を発芽させ感染する。また、地表にキノコを形成し、そこから胞子を飛散させることによっても感染する。
- 対策** ●定植後、株間のふさぎきらない時期に薬剤散布をおこなう。
●排水性を改善する。
●発病株は圃場外へ廃棄する。

黒斑細菌病



- 症状** ●葉に黄褐色の小さい斑点が発生、水に濡れたように見える。
- 原因** ●土壌に含まれる病原菌が、水や雨によって付着することで発病する。
- 対策** ●病原菌に感染した残渣が土壌に残っていると、翌シーズンも黒斑細菌病が発生するリスクがあるため、多発圃場では連作を避ける。
●防除薬剤としては、スターナ水和剤、クプロシールドなどが有効。

黄化葉巻病



- 症状** ●コナジラミによってウイルスが媒介され、新葉が黄化して葉が巻く。
●葉が縮れて生育が停滞する。
- 対策** ●薬剤による定期的な予防散布。
●防虫ネット、粘着シートの利用、作物残渣や雑草の除草処理などを行い、ハウス環境を整える。
●耐病性品種の利用。

灰色かび病



- 症状** ●果実、花、茎に灰色のかびが生じる病気。
●葉には褐色の大型円形病斑を生じ、茎や葉柄には暗褐色水浸状の円形病斑を生じる。
- 原因** ● 20℃前後の比較的冷涼な気温と多湿条件で発生する。
- 対策** ●多湿条件にならないよう、換気を十分にする。
●薬剤による定期的な予防散布。

青枯病



- 症状** ●根が枯れた状態になり、地上部は日中にしおれ、夜間には戻る状態を数日繰り返して、やがて戻らなくなる。
●しおれた茎葉は後に褐変し枯死する。
- 原因** ●典型的な高温期の病害。
●病原菌は土壌伝染性病原菌であり、芽かき、摘芯、移植、中耕などの管理作業でできた傷口から感染する。
- 対策** ●耐病性台木の利用。
●発生圃場では土壌消毒による薬剤処理。
●マルチや断熱資材を用いて地温を上げないよう努める。

疫病



- 症状** ●葉・茎・果実に褐色の病斑ができる病気。後に、急速に拡大して暗褐色の大病斑となる。
- 原因** ●季節問わず多湿時に発生しやすい。
●病原菌は水中を遊走子によって泳いで伝搬し、感染するので、降雨・灌水・結露などは主要な要因となる。
- 対策** ●病害は発生してから急速に拡大するので、薬剤による予防散布が極めて重要。

豊かな稔りは良いタネから

ナカガミのタネ

株式会社 中神種苗店

本社 〒441-3427 愛知県田原市加治町新田67-1
Tel.(0531)24-1611
Fax.(0531)24-1612

渥美営業所 〒441-3615 田原市中山町作道152-1
Tel.(0531)34-1111
Fax.(0531)34-1112

とうがや店 〒441-3414 田原市東神戸町御農37-1
Tel.(0531)27-0780
Fax.(0531)27-0781

豊橋営業所 〒441-3301 豊橋市老津町池上81-1
TEL (0532)-23-1110
FAX (0532)-23-4411

バイパス店 〒441-3426 田原市大久保町黒河原466-2
Tel.(0531)22-0707
Fax.(0531)23-7033

浜松営業所 〒431-1112 静岡県浜松市中央区大人見町3394-2
Tel.(053)482-2100
Fax.(053)485-2200

豊川営業所 〒442-0806 豊川市牧野町久護43-1
Tel.(0533)86-8188
Fax.(0533)86-8868

中神種苗店 検索



..... 関連会社

施設園芸のパートナー

ナカガミハウス

株式会社 **ナカガミハウス**

〒441-3615 田原市中山町中田101-1
Tel.(0531)34-1115
Fax.(0531)34-1114



一般社団法人
日本種苗協会®
会員番号23-071号